

Persbericht

Zoetermeer, 2 december 2021

NIEUWE AANBEVOLEN RASSEN VAN SNIJMAÏS, KORRELMAÏS EN CORN COB MIX

Er zijn 17 nieuwe maïsrassen opgenomen in de Aanbevelende Rassenlijst voor 2022. Dit meldt de Commissie Samenstelling Aanbevelende Rassenlijst (CSAR), waarin BO Akkerbouw, Plantum en LTO-Nederland samenwerken.

De onderstaande rassen zijn voor het eerst opgenomen in de N-rubriek (nieuw aanbevolen). De eigenschappen van de rassen staan vermeld in de tabellen.

Snijmaïs, zeer vroege en vroege rassen

Emeleen	Kweker: Limagrain Europe S.A., Saint Beuzire (F) Vertegenwoordiger: Limagrain Nederland B.V., Rilland
Benco	Kweker: Limagrain Europe S.A., Saint Beuzire (F) Vertegenwoordiger: Syngenta Seeds B.V., Enkhuizen
KWS Johaninio	Kweker: KWS Saat S.E., Einbeck (D) Vertegenwoordiger: KWS Benelux, Etten-Leur
SY Hummer	Kweker: Syngenta France S.A.S., St. Sauveur (F) Vertegenwoordiger: Syngenta Seeds B.V., Enkhuizen
LG 31.228	Kweker: Limagrain Europe S.A., Saint Beuzire (F) Vertegenwoordiger: Limagrain Nederland B.V., Rilland
SY Invictus	Kweker: Syngenta France S.A.S., St. Sauveur (F) Vertegenwoordiger: Syngenta Seeds B.V., Enkhuizen

Snijmaïs, middenvroeg en middenlate rassen

Greatful	Kweker: Freiherr Von Moreau Saatzucht GmbH, Osterhofen (D) Vertegenwoordiger: RAGT Benelux B.V., Kessel
SY Feronia	Kweker: Syngenta France S.A.S., St. Sauveur (F) Vertegenwoordiger: Syngenta Seeds B.V., Enkhuizen
SY Nomad	Kweker: Syngenta France S.A.S., St. Sauveur (F) Vertegenwoordiger: Syngenta Seeds B.V., Enkhuizen
SY Dakini	Kweker: Syngenta France S.A.S., St. Sauveur (F) Vertegenwoordiger: Syngenta Seeds B.V., Enkhuizen

Korrelmaïs en corn cob mix

Ashley	Kweker: Limagrain Europe S.A., Saint Beuzire (F) Vertegenwoordiger: Limagrain Nederland B.V., Rilland
Farmoritz	Kweker: Freiherr Von Moreau Saatzucht GmbH, Osterhofen (D) Vertegenwoordiger: farmsaat Nederland, Varsseveld

KWS Memento	Kweker: KWS Saat S.E., Einbeck (D) Vertegenwoordiger: KWS Benelux, Etten-Leur
SY Brenton	Kweker: Syngenta France S.A.S., St. Sauveur (F) Vertegenwoordiger: Syngenta Seeds B.V., Enkhuizen
SY Calo	Kweker: Syngenta France S.A.S., St. Sauveur (F) Vertegenwoordiger: Syngenta Seeds B.V., Enkhuizen
Farmueller	Kweker: Freiherr Von Moreau Saatzucht GmbH, Osterhofen (D) Vertegenwoordiger: farmsaat Nederland, Varsseveld
KWS Curacao	Kweker: KWS Saat S.E., Einbeck (D) Vertegenwoordiger: KWS Benelux, Etten-Leur

CSAR beslist over de samenstelling van de Aanbevelende Rassenlijst. Deskundigen van het bedrijfsleven bereiden de beslissingen inhoudelijk voor.

Meer informatie

Secretariaat CSAR: Hans de Keijzer, telefoon 06 - 52723623.

Publicatie van de tabel is toegestaan, mits de gegevens integraal worden opgenomen en met bronvermelding "CSAR, Aanbevelende Rassenlijst 2022".

Tabel 1a. Aanbevelende Rassenlijst 2022 - Snijmais, zeer vroege en vroege rassen

Aanbevolen rassen

Gemiddelde resultaten over de jaren 2016 t/m 2021 ¹⁾

Rubricering ²⁾	Rasnaam	Stevigheid	Zomerlegering	Green snap	Stengelrotresistentie	Builenbrandresistentie	Helminthosporium tolerantie	Snelheid grondbedekking	Plantlengte	Vroegheid bloei ³⁾	Drogestofgehalte gehele plant in %	Drogestofgehalte	Zetmeelgehalte bij oogst	Zetmeelgehalte bij 35% drogestof	VEM/kgds ⁴⁾	Drogestofopbrengst	VEM-opbrengst	Aantal jaar in onderzoek ⁵⁾
AANBEVOLEN RASSEN - Snijmais, zeer vroeg en vroeg																		
N	Autens KWS	6,5	6,5	*	5	8	*	9	102	8,5	40,8	111	105	100	99	95	94	6
	Asgaard	8,5	8	*	7	8	*	7	96	8,5	40,2	109	104	106	100	93	94	6
	MAS 08F	7	7	*	7	8,5	*	7,5	90	8	40,0	109	104	102	101	94	95	6
	Papageno	7	7	*	6	7,5	*	8	101	8	39,5	107	103	102	101	101	102	4
	LG 31.205	8	8	*	8,5	6,5	*	6	107	8	38,3	104	104	103	100	101	101	6
	LG 31.211	7,5	7,5	*	8,5	8	*	7,5	97	8	38,1	104	103	102	102	98	100	6
	LG 31.218	7,5	7,5	*	7,5	8	*	8	99	8	37,9	103	102	100	101	98	99	6
	Rancador	7,5	7	*	7,5	8	*	7,5	103	8	37,6	102	98	97	99	100	100	4
	AgroMilas	7,5	8	*	8	8	*	7	101	7,5	37,6	102	99	98	100	99	99	4
	Emeleen	7,5	8	*	8,5	7	*	6,5	108	7,5	37,5	102	99	*	100	102	102	3
N	Benco	6,5	7	*	8	7,5	*	7,5	101	7,5	37,5	102	96	94	101	103	104	4
	LG 31.207	8	7,5	*	8,5	7	*	6,5	107	7,5	37,5	102	98	97	100	102	102	5
	KWS Johaninio	8	7,5	*	8	8	*	8	98	7,5	37,2	101	101	*	99	100	99	3
	KWS Saltare	7,5	7,5	*	7,5	7,5	*	8	104	7,5	36,7	100	98	97	100	101	100	4
	Farmezzo	7	6,5	*	7,5	7,5	*	7,5	103	7	36,6	99	99	99	99	98	97	6
	P8057	8	7,5	8,5	8	8	8,5	7	98	8	36,6	99	100	100	101	95	96	6
	LG 31.214	7	7,5	*	8	7	*	7	98	7,5	36,6	99	98	98	101	101	102	5
	SY Skandik	7,5	8	*	8	8,5	*	6,5	98	7,5	36,5	99	101	102	100	100	101	6
	SY Hummer	7	8	*	8	7,5	*	8,5	100	7,5	36,5	99	100	*	100	100	100	3
	Smoothi CS	8	7,5	*	7	8	*	8	102	7	36,4	99	96	96	96	98	94	6
N	LG 31.219	7,5	8	*	8	8,5	*	7	106	8	36,3	99	100	101	100	100	100	6
	LG 31.220	8	8	*	8	6	*	7	100	7,5	36,3	98	95	96	100	102	102	5
	SY Invictus	8	8	*	7,5	6	*	7	105	7	35,7	97	93	*	99	105	105	3
	LG 31.228	7	7,5	*	8	7	*	7	110	7	35,4	96	92	*	98	105	103	3
	Benedictio KWS	8	7	*	8	8	*	8,5	104	7	35,4	96	93	94	99	102	100	6
	SY Telias	7	7	*	6,5	7,5	*	8	95	7	35,3	96	102	103	99	101	100	6
	Farmodena	7	6	*	6	8	*	7	99	7,5	35,3	96	99	101	97	102	100	6
	Vicente	7	7,5	*	6	8	*	7,5	94	7,5	35,1	95	99	101	102	97	98	6
	Privat	7	6,5	*	7	7,5	*	6,5	98	7,5	34,4	93	99	101	99	103	102	5
100=..resp. in cm, %, gr/kgds (2x), VEM/kgds, ton/ha, 1000 kVEM/ha									310	36,8			395	383	993	22,1	21,9	

NB. Vanwege andere standaardrassen en proeflocaties zijn de resultaten niet te vergelijken met die in tabel 2, middenvroeg/middenlate rassen.

- ¹⁾ Plantlengte, drogestofgehalte, zetmeelgehalte, VEM/kgds, drogestofopbrengst en VEM-opbrengst weergegeven in verhoudingsgetallen. Drogestofgehalte ook in absolute waarde. Overige eigenschappen in waarderingscijfers, waarbij een hoog cijfer voor een gunstige waardering staat.
 - ²⁾ Rassen staan gerangschikt op volgorde van vroegheid. Rassen die 1 of 2 jaar op de lijst staan zijn aangeduid met een N - Nieuw Aanbevolen.
 - ³⁾ De vroegheid van vrouwelijke bloei is vooral van belang in ongunstige jaren. Bij rassen met een gelijk drogestofgehalte hebben laat bloeiende rassen in die jaren vaak een lager drogestofgehalte.
 - ⁴⁾ De VEM/kgds is bepaald met NIRS, gekalibreerd op Tilley en Terry.
 - ⁵⁾ Na minimaal 3 jaar onderzoek kan een ras worden aanbevolen. Betrouwbaarheid van cijfers is groter bij meer jaren van onderzoek. Sommige rassen staan al langer dan 6 jaar op de Rassenlijst, maar resultaten worden gebaseerd op de laatste 6 jaar.
- * Onvoldoende resultaten beschikbaar

Tabel 1b. AANBEVELENDE RASSENLIJST 2022 - Snijmaïs, zeer vroege en vroege rassen

Meerjarig onderzochte rassen - (nog) niet aanbevelen

Gemiddelde resultaten over de jaren 2016 t/m 2021 ¹⁾

Rubricering ²⁾ Rasnaam	Stevigheid	Zomerlegering	Green snap	Stengelrotresistentie	Builenbrandresistentie	Helminthosporium tolerantie	Snelheid grondbedekking	Plantlengte	Vroegheid bloei ³⁾	Drogestofgehalte gehele plant in %	Drogestofgehalte	Zetmeelgehalte bij oogst	Zetmeelgehalte bij 35% drogestof	VEM/kgds ⁴⁾	Drogestofopbrengst	VEM-opbrengst	Aantal jaar in onderzoek ⁵⁾
MEERJARIG ONDERZOCHE RASSEN - Snijmaïs , zeer vroeg en vroeg																	
RH19040	8	8	*	8,5	8,5	*	7,5	104	8,5	39,7	108	96	*	98	96	95	2
X75R469	6,5	6	*	6,5	7	*	8	101	7,5	39,3	107	98	*	99	99	98	2
RH20056	7	8	*	3	8,5	*	8	98	8	39,2	106	101	*	98	98	96	2
X75R460	6,5	6	*	6	7,5	*	8	103	8	39,1	106	102	*	97	98	95	2
X75R461	6,5	7	*	6	8,5	*	8	106	7,5	39,0	106	98	*	96	97	93	2
LZM170/72	7,5	7,5	*	7,5	7,5	*	7,5	99	8	38,4	104	102	*	102	102	105	2
RH20054	8	8	*	8	6,5	*	7,5	107	7,5	38,0	103	92	*	97	101	98	2
LZM170/71	7,5	7	*	7	8	*	7,5	105	8	37,8	103	100	*	100	102	101	2
X75R467	6,5	7,5	*	8	7,5	*	8,5	104	7,5	37,6	102	92	*	99	101	100	2
Purpose	7,5	7	*	7,5	7,5	*	6	107	7,5	37,2	101	101	*	100	102	101	2
DKC 3218	8	8	*	9	8	*	8,5	101	7,5	37,0	100	91	*	99	101	100	2
SMH0181	6,5	7,5	*	7,5	7,5	*	7,5	101	7,5	36,8	100	99	*	100	101	101	3
KWS Curacao	8	7	*	7,5	8	*	8,5	105	7	36,6	99	96	*	98	105	103	2
SA0188	7,5	7,5	*	8,5	8	*	8	105	8	36,5	99	97	*	98	98	96	2
SA0669	7,5	7,5	*	8,5	6	*	7,5	101	7,5	36,2	98	94	*	98	101	99	2
LZM170/73	8	8	*	7,5	7	*	7	105	7,5	36,1	98	96	*	98	103	101	2
RH20057	7,5	7,5	*	7,5	6,5	*	9	106	7	36,0	98	85	*	94	100	94	2
MAS 195P	8	8,5	*	6	8	*	7,5	109	7	35,3	96	98	*	98	99	97	2
SG104	7,5	7	*	8	8	*	7,5	97	8	34,5	94	98	*	98	102	99	3
100=..resp. in cm, %, gr/kgds (2x), VEM/kgds, ton/ha, 1000 kVEM/ha								310	36,8			395	383	993	22,1	21,9	

NB. Vanwege andere standaardrassen en proeflocaties zijn de resultaten niet te vergelijken met die in tabel 2, middenvroeg/middenlate rassen.

- ¹⁾ Plantlengte, drogestofgehalte, zetmeelgehalte, VEM/kgds, drogestofopbrengst en VEM-opbrengst weergegeven in verhoudingsgetallen. Drogestofgehalte ook in absolute waarde. Overige eigenschappen in waarderingscijfers, waarbij een hoog cijfer voor een gunstige waardering staat.
 - ²⁾ Rassen staan gerangschikt op volgorde van vroegheid. Rassen die 1 of 2 jaar op de lijst staan zijn aangeduid met een N - Nieuw Aanbevelen.
 - ³⁾ De vroegheid van vrouwelijke bloei is vooral van belang in ongunstige jaren. Bij rassen met een gelijk drogestofgehalte hebben laat bloeiende rassen in die jaren vaak een lager drogestofgehalte.
 - ⁴⁾ De VEM/kgds is bepaald met NIRS, gekalibreerd op Tilley en Terry.
 - ⁵⁾ Na minimaal 3 jaar onderzoek kan een ras worden aanbevelen. Betrouwbaarheid van cijfers is groter bij meer jaren van onderzoek. Sommige rassen staan al langer dan 6 jaar op de Rassenlijst, maar resultaten worden gebaseerd op de laatste 6 jaar.
- * Onvoldoende resultaten beschikbaar

Tabel 2a. AANBEVELENDE RASSENLIJST 2022 - Snijmaïs - Midden vroege en midden late rassen

Aanbevolen rassen

Gemiddelde resultaten over de jaren 2016 t/m 2021 ¹⁾

Rubricering ²⁾	Rasnaam	Stevigheid	Zomerlegering	Green snap	Stengelrotresistentie	Builenbrandresistentie	Helminthosporium tolerantie	Snelheid grondbedekking	Plantlengte	Vroegheid bloei ³⁾	Drogestofgehalte gehele plant in %	Drogestofgehalte	Zetmeelgehalte bij oogst	Zetmeelgehalte bij 35% drogestof	VEM/kgds ⁴⁾	Drogestofopbrengst	VEM-opbrengst	Aantal jaar in onderzoek ⁵⁾
AANBEVOLEN RASSEN - Snijmaïs, middenvroeg en middenlaat																		
	Genialis KWS	8	*	*	8	8,5	8	8	94	8	37,9	104	102	104	101	98	99	6
	Farmerino	8	*	*	7,5	6,5	*	7	101	7,5	37,8	103	104	101	99	94	93	6
N	Greatful	8	*	*	7,5	7	*	8,5	98	7,5	37,7	103	103	*	101	100	101	3
N	LG 31.245	6	*	*	8	7	*	6	109	7,5	37,4	102	97	95	99	102	101	4
	Severeen	7	*	*	7,5	8	*	6	107	7	37,4	102	98	97	100	101	101	6
N	Milkmax	7	*	*	7	7	*	7,5	103	7	37,3	102	98	94	99	99	98	4
	Torres	8	7	7	8	8	8	8	100	8	37,0	101	102	101	102	97	99	6
	Digital	7,5	*	*	7	7	*	7	96	7,5	36,8	101	101	100	100	101	101	5
	DS1890B	6,5	*	*	7,5	7,5	*	6	104	7,5	36,7	100	98	96	100	99	99	5
	LG 31.235	8	*	*	8	7,5	7,5	7	98	7,5	36,5	100	93	93	101	98	99	6
	P8333	6,5	*	*	7,5	6,5	*	7	104	6,5	36,3	99	93	92	99	101	99	6
N	SY Nomad	7,5	*	*	8,5	9	*	6,5	106	7	36,2	99	94	*	102	103	105	3
N	SY Dakini	7	*	*	8	8,5	*	6	102	7,5	36,1	99	93	92	103	100	103	4
	Farmueller	7,5	*	*	6,5	8	*	7	99	7	36,1	99	100	99	100	102	102	5
	Farmoritz	8	*	*	7	7,5	*	6	100	7,5	35,6	97	103	105	100	100	100	6
N	SY Feronia	7,5	*	*	7,5	6	*	7	98	7	35,4	97	93	*	100	102	102	3
N	Sudress	7,5	*	*	6,5	7	*	7,5	101	6,5	35,4	97	94	94	98	101	99	4
	SY Gordius	6	*	*	7	7	*	6,5	105	7	35,0	96	90	93	101	100	102	6
	EC Gisella	6,5	*	*	7	8	*	7	101	6,5	34,5	94	97	100	99	103	102	5
100=..resp. in cm, %, gr/kgds(2x), VEM/kgds, ton/ha, 1000 kVEM/ha									317	36,6			396	385	990	22,8	22,5	

NB. Vanwege andere standaardrassen en proeflocaties zijn de resultaten niet te vergelijken met die in tabel 1, zeer vroege/vroege rassen.

- ¹⁾ Plantlengte, drogestofgehalte, zetmeelgehalte, VEM/kgds, drogestofopbrengst en VEM-opbrengst weergegeven in verhoudingsgetallen. Drogestofgehalte ook in absolute waarde. Overige eigenschappen in waarderingscijfers, waarbij een hoog cijfer voor een gunstige waardering staat.
 - ²⁾ Rassen staan gerangschikt op volgorde van vroegheid. Rassen die 1 of 2 jaar op de lijst staan zijn aangeduid met een N - Nieuw Aanbevolen.
 - ³⁾ De vroegheid van vrouwelijke bloei is vooral van belang in ongunstige jaren. Bij rassen met een gelijk drogestofgehalte hebben laat bloeiende rassen in die jaren vaak een lager drogestofgehalte.
 - ⁴⁾ De VEM/kgds is bepaald met NIRS, gekalibreerd op Tilley en Terry.
 - ⁵⁾ Na minimaal 3 jaar onderzoek kan een ras worden aanbevolen. Betrouwbaarheid van cijfers is groter bij meer jaren van onderzoek. Sommige rassen staan al langer dan 6 jaar op de Rassenlijst, maar resultaten worden gebaseerd op de laatste 6 jaar.
- * Onvoldoende resultaten beschikbaar

Tabel 2b. AANBEVELENDE RASSENLIJST 2022 - Snijmaïs - Midden vroege en midden late rassen

Meerjarig onderzochte rassen - (nog) niet aanbevolen

Gemiddelde resultaten over de jaren 2016 t/m 2021 ¹⁾

Rubricering ²⁾	Rasnaam	Stevigheid	Zomerlegering	Green snap	Stengelrotresistentie	Builenbrandresistentie	Helminthosporium tolerantie	Snelheid grondbedekking	Plantlengte	Vroegheid bloei ³⁾	Drogestofgehalte gehele plant in %	Drogestofgehalte	Zetmeelgehalte bij oogst	Zetmeelgehalte bij 35% drogestof	VEM/kgds ⁴⁾	Drogestofopbrengst	VEM-opbrengst	Aantal jaar in onderzoek ⁵⁾
MEERJARIG ONDERZOCHE RASSEN - Snijmaïs middenvroeg en middenlaat																		
	X80R603	7,5	*	*	5,5	8	*	6,5	105	7	39,6	108	95	*	99	100	99	2
	LZM170/47	8,5	*	*	7,5	8,5	*	6,5	104	7	39,5	108	103	*	101	103	104	2
	DKC 3204	8	*	*	8	8,5	*	7,5	103	7,5	39,1	107	97	*	101	97	98	2
	CS Luxuri	8	*	*	7,5	7,5	*	7,5	96	8	38,4	105	103	*	101	98	99	2
	X80R595	8	*	*	8	8,5	*	7	105	7	38,1	104	91	*	99	102	100	2
	X75R471	6	*	*	7	8,5	*	8,5	110	7,5	37,8	103	97	*	99	98	97	2
	X80R593	7	*	*	7	7	*	7	105	7,5	37,6	103	93	*	100	103	102	2
	Gwendoleen	7	*	*	8,5	8,5	*	7,5	110	7,5	37,4	102	100	*	100	104	104	2
	Glutexo	7,5	*	*	6	8	*	7,5	96	7	37,1	101	102	*	100	102	103	2
	X80R601	6,5	*	*	8	6	*	6,5	102	7,5	36,8	101	90	*	100	100	99	2
	Stalone	8	*	*	7,5	8,5	*	7	103	7	36,3	99	99	*	98	101	99	2
	SMK0359	7	*	*	7,5	8	*	8	104	6,5	36,2	99	94	*	98	96	94	2
	X80R610	6	*	*	8	9	*	8	107	7	36,0	99	90	*	99	100	100	2
	Ribello	6,5	*	*	8,5	8,5	*	7,5	98	7,5	35,4	97	96	*	99	99	98	2
100=..resp. in cm, %, gr/kgds(2x), VEM/kgds, ton/ha, 1000 kVEM/ha									317	36,6			396	385	990	22,8	22,5	

NB. Vanwege andere standaardrassen en proeflocaties zijn de resultaten niet te vergelijken met die in tabel 1, zeer vroege/vroege rassen.

- ¹⁾ Plantlengte, drogestofgehalte, zetmeelgehalte, VEM/kgds, drogestofopbrengst en VEM-opbrengst weergegeven in verhoudingsgetallen. Drogestofgehalte ook in absolute waarde. Overige eigenschappen in waarderingscijfers, waarbij een hoog cijfer voor een gunstige waardering staat.
- ²⁾ Rassen staan gerangschikt op volgorde van vroegheid. Rassen die 1 of 2 jaar op de lijst staan zijn aangeduid met een N - Nieuw Aanbevolen.
- ³⁾ De vroegheid van vrouwelijke bloei is vooral van belang in ongunstige jaren. Bij rassen met een gelijk drogestofgehalte hebben laat bloeiende rassen in die jaren vaak een lager drogestofgehalte.
- ⁴⁾ De VEM/kgds is bepaald met NIRS, gekalibreerd op Tilley en Terry.
- ⁵⁾ Na minimaal 3 jaar onderzoek kan een ras worden aanbevolen. Betrouwbaarheid van cijfers is groter bij meer jaren van onderzoek. Sommige rassen staan al langer dan 6 jaar op de Rassenlijst, maar resultaten worden gebaseerd op de laatste 6 jaar.
- * Onvoldoende resultaten beschikbaar

Tabel 3. AANBEVELENDE RASSENLIJST 2022 - Korrelmaïs en corn cob mix

Gemiddelde resultaten over de jaren 2016 t/m 2021 ¹⁾

Rubricering ²⁾	Rasnaam	Snelheid grondbedekking	Vroegheid bloei	Helminthosporium tolerantie	Oogstbaarheid ³⁾	Stengelrot resistentie	Stevigheid	Zomerlegering	Plantlengte	Korrel			Aantal jaren in onderzoek ⁶⁾
										Vochtgehalte ⁴⁾	Drogestof gehalte	Drogestof opbrengst ⁵⁾	
AANBEVOLEN RASSEN - korrelmaïs en corn cob mix													
N	KWS Stabil	7	7	*	6,5	6	6,5	7,5	107	23,8	104	95	6
	KWS Prixdor	8	8	*	7,5	7,5	7,5	*	95	24,6	103	96	5
	KWS Curacao	9	6,5	*	7	6,5	7	*	106	24,8	102	100	3
	KWS Memento	9	7	*	7,5	7,5	7,5	*	99	25,8	101	98	3
N	SY Brenton	7,5	7	*	6,5	6	7,5	*	87	25,9	101	98	3
N	Benedictio KWS	9	7	*	7	7	7,5	8	103	26,6	100	96	6
	Ashley	8,5	7,5	*	7	7	7	*	104	26,6	100	105	3
	ES Hubble	7,5	7,5	*	8,5	8,5	7,5	*	108	26,8	100	97	6
	AgroFides	8	7,5	*	7,5	7,5	7,5	*	98	26,9	100	99	6
N	Genialis KWS	8	7,5	7,5	8	8	8	8	94	27,2	99	100	6
	Megusto KWS	7,5	9	*	7	6,5	7,5	7	97	27,3	99	102	6
	SY Calo	7	7	*	7	7	7,5	*	91	27,3	99	103	3
	LG 31.219	7	8	*	7,5	7,5	7,5	*	103	27,5	99	102	4
N	Ricardinio	8	7	7	7	7	7,5	8	105	27,6	99	98	6
	KWS Corazon	8	7,5	*	8	8	8	*	103	27,8	98	103	5
	LG 31.225	7,5	8	*	7,5	7,5	7,5	*	98	28,0	98	102	5
	Farmoritz	6,5	7	*	7,5	7,5	7,5	*	98	30,4	95	110	3
N	KWS Gustavius	7	6	*	8,5	8,5	8	*	96	30,5	95	102	4
N	Farmueller	7	6,5	*	7,5	7	7,5	*	97	31,0	94	107	3
MEERJARIG ONDERZOCHE RASSEN - korrelmaïs en corn cob mix - (nog) niet aanbevolen													
	KXC0016	8	7,5	*	6	6	7	*	98	23,3	104	96	2
	KXC0032	8,5	7,5	*	6	6,5	6,5	*	105	25,5	101	99	2
	KWS Kampinos	9	9	*	6,5	7	6	*	92	26,2	101	99	2
	X75R464	7,5	7	*	6,5	5,5	8	*	96	27,3	99	103	2
	KXC0017	9	7,5	*	7,5	7,5	8	*	94	27,5	99	102	2
	ES Midgard	6,5	7	*	7	6,5	7,5	*	100	27,9	98	100	2
	X80R596	7,5	6,5	*	7	6	8	*	97	29,3	96	101	2
	Privat	7	7,5	*	7	7,5	7	*	97	29,5	96	111	2
100=...resp. in cm, %, ton/ha									325	73,5	10,8		

- 1) Plantlengte, drogestofgehalte en drogestofopbrengst zijn weergegeven in verhoudingsgetallen
 - 2) Rassen gerangschikt op volgorde van vroegheid. N - Nieuw Aanbevolen, rassen die voor 1e of 2e jaar op de lijst staan.
 - 3) Oogstbaarheid duidt op de kans op omgevallen planten door zowel een stengelrotaantasting als door gebrek aan stevigheid. Beide eigenschappen zijn ook afzonderlijk aangegeven.
 - 4) Vochtgehalte is 100 - drogestofgehalte (absoluut). Laag vochtgehalte betekent lagere droogkosten en is dus gunstig voor korrelmaïs
 - 5) 100 = 12.81 ton/ha bij 16% vocht (korrelmaïs) en 16.55 ton/ha bij 35% vocht (corn cob mix) - proefveldopbrengsten
 - 6) Na minimaal 3 jaar onderzoek kan een ras worden aanbevolen. Betrouwbaarheid van cijfers is groter bij meer jaren van onderzoek. Sommige rassen staan al langer dan 6 jaar op de Rassenlijst, maar resultaten worden gebaseerd op de laatste 6 jaar.
- * Onvoldoende resultaten beschikbaar.

Tabel 4. Rassenlijst 2022 - Positieve Lijst van rassen geschikt voor uitzaai op Maiskopbrand besmette percelen.
Gemiddeld aantastingspercentage over minimaal 2 jaar en minimaal 4 proeven

Snijmais		Snijmais		Korrelmais / CCM	
Zeet vroeg / Vroege rassen		Midden vroege / Midden late rassen			
Smoothi CS	0,0%	Genialis KWS	0,9%	Genialis KWS	0,4%
P8057	0,1%	SY Dakini	1,1%	KWS Priedor	0,6%
MAS 08F	0,1%	Farmerino	1,2%	Megusto KWS	1,2%
SY Skandik	0,2%	SY Gordius	1,5%	KWSGustavius	1,9%
SY Telias	0,2%	Milkmax	1,7%	ES Hubble	3,0%
Vicente	0,7%				
Benco	1,6%				

Meest gevoelige rassen hebben een aantasting van 30-60%