

NIEUWE CIJFERS AANBEVOLEN RASSEN VAN GROENBEMESTERS

Er worden drie nieuwe rassen bladrammenas opgenomen in de Aanbevelende Rassenlijst, er wordt één nieuw ras gele mosterd opgenomen en er worden geen nieuwe rassen Japanse haver opgenomen in de Aanbevelende Rassenlijst. Alle cijfers en de rubricering van de aanbevolen rassen zijn geactualiseerd. Dit meldt de Commissie Samenstelling Aanbevelende Rassenlijst (CSAR), waarin BO Akkerbouw, Plantum en LTO-Nederland samenwerken.

De nieuwe rassen bladrammenas, waarvan de eigenschappen worden vermeld in de tabellen 2 en 4 zijn als volgt:

Bladrammenas - met resistentie tegen bietencystenaaltje (BCA 2) en resistentie tegen M. Chitwoodi

Mamba	kweker:	Joordens Zaden B.V. Kessel
-------	---------	----------------------------

Sharky	kweker:	Joordens Zaden B.V. Kessel
--------	---------	----------------------------

Bladrammenas - met resistentie tegen bietencystenaaltje (BCA 2)

Viper	kweker:	Joordens Zaden B.V. Kessel
-------	---------	----------------------------

Het nieuwe ras Gele mosterd, waarvan de eigenschappen worden vermeld in tabel 5 is de volgende:

Gele Mosterd

Brisant	kweker:	Joordens Zaden B.V., Kessel
	Vertegenwoordiger:	Limagrain Nederland B.V., Rilland

CSAR beslist over de samenstelling van de Aanbevelende Rassenlijst. De beslissingen worden inhoudelijk voorbereid door deskundigen uit het bedrijfsleven.

Meer informatie

Secretariaat CSAR: Frans Verwer, telefoon 06 - 81335633.

Publicatie van de tabellen is toegestaan, mits de gegevens integraal worden opgenomen en met bronvermelding "CSAR, Aanbevelende Rassenlijst 2026".

Tabel 1. Bladrammenas - met resistentie tegen bietencystenaaltje (BCA 1) en *Meloidogyne chitwoodi* geschikt voor uitzaai in het najaar (stoppelgewas)

Overzicht van de eigenschappen bij bladrammenasrassen

(gemiddelde resultaten over de jaren 2019 t/m 2024, proeven uitgevoerd op zandgrond in Zuidoost-Nederland en Oostelijk Flevoland).

Een hoog waarderingcijfer staat voor: vlotte grondbedekking, late bloei, weinig knolvorming, goede resistentie tegen *Alternaria*, goede hergroei na laat maaien en vorstgevoelig.

Rubricering ¹⁾	Rasnaam	Resistentie tegen het witte bietencystenaaltje ²⁾ (Pf/Pi-waarde)	Resistentie tegen <i>M. chitwoodi</i> ³⁾	Snelheid grondbedekking	Laatheid bloei	Mate van knol-ontwikkeling	Lengte (rel. 100 = 97 cm)	Resistentie tegen <i>Alternaria</i> ⁵⁾	Hergroei na laat maaien	Vorst gevoeligheid
A	Angus	< 0,1	R ⁴	8	8,5	8,5	105	7,5	7	6,5
A	Doublet	< 0,1 ⁶⁾	R ⁴	7,5	8,5	8	107	7	7	7
A	Cordoba	<0,1	R ³	7,5	8	8	134	7,5	6	7
N	Almeria	< 0,1	R ⁴	8,5	8,5	8,5	119	8	7	6

¹⁾ Rubricering: A = algemeen aanbevolen ras; B = beperkt aanbevolen ras; N = nieuw aanbevolen ras

²⁾ Een lage Pf/Pi-waarde betekent een hoge mate van resistentie.

³⁾ R = resistent tegen maiswortelknobbelaaltje (*M. chitwoodi*), Onderzoek op basis van tellingen van eiproppen.

⁴⁾ R = resistent tegen maiswortelknobbelaaltje (*M. chitwoodi*), Onderzoek op basis van tellingen van aanwezige aaltjes

⁵⁾ Het betreft *Alternaria*-soorten die alleen op kruisbloemigen voorkomen. Kans op overdracht van groenbemester op cultuurgewas is alleen aanwezig bij koolgewassen of koolzaad. O.a. bieten, aardappelen, uien en peen lopen geen gevaar, omdat het andere *Alternaria*-soorten betreft.

⁶⁾ Cijfer berust op oud onderzoek

Tabel 2. Bladrammenas - met resistentie tegen bietencystenaaltje (BCA 2) en Meloidogyne chitwoodi geschikt voor uitzaai in het najaar (stoppelgewas)

Overzicht van de eigenschappen bij bladrammenasrassen

(gemiddelde resultaten over de jaren 2019 t/m 2024, proeven uitgevoerd op zandgrond in Zuidoost-Nederland en Oostelijk Flevoland)

Een hoog waarderingcijfer staat voor: vlotte grondbedekking, late bloei, weinig knolvorming, goede resistentie tegen Alternaria, goede hergroei na laat maaien en vorstgevoelig.

Rubricering ¹⁾	Rasnaam	Resistentie tegen het witte bietencystenaaltje ²⁾ (Pf/Pi-waarde)	Resistentie tegen <i>M. chitwoodi</i> ³⁾	Snelheid grondbedekking	Laatheid bloei	Mate van knolontwikkeling	Lengte (rel. 100 = 97 cm)	Resistentie tegen Alternaria ⁵⁾	Hergroei na laat maaien	Vorst gevoeligheid
A	Control	0,1 - 0,3	R ³	8	8,5	8	99	7,5	7	6,5
A	Jorba	0,1 - 0,3	R ³	8	8,5	8	113	7,5	6	7
A	Triangel	0,1 - 0,3	R ³	8	8,5	7,5	85	6,5	7	6,5
A	Valencia	0,1 - 0,3	R ³	8	8,5	8,5	118	7,5	6	7
A	Radetzky	0,1 - 0,3	R ³	7,5	9	8	68	7	7,5	7
A	Cobra	0,1 - 0,3	R ³	7,5	8,5	7,5	93	7,5	7	7
A	Terranova	0,1 - 0,3	R ³	7,5	8,5	7,5	77	7	7	6,5
A	Dracula	0,1 - 0,3 ⁶⁾	R ³	7	9	9	55	5	7,5	7
A	Anaconda	0,1 - 0,3 ⁶⁾	R ³	7,5	8	6,5	113	6,5	7	6
A	Tajuna	0,1 - 0,3	R ³	7,5	8	8	118	7	6,5	7,5
A	Adventure	0,1 - 0,3	R ⁴	7	8,5	8,5	100	7	6,5	7,5
B	Geron	0,1 - 0,3	R ³	8	6,5	8,5	130	7,5	6	7,5
B	Toledo	0,1 - 0,3	R ³	7,5	6,5	9	132	7,5	6	7,5
N	Mamba	0,1 - 0,3	R ⁴	8	8,5	7	93	7,5	7	6,5
N	Sharky	0,1 - 0,3	R ⁴	8	8,5	8	111	7,5	6,5	7
N	Vilada	0,1 - 0,3	R ⁴	8	8,5	7,5	104	6,5	7	7,5
N	Carrera	0,1 - 0,3	R ⁴	7	8,5	8,5	98	7	6	7

¹⁾ Rubricering: A = algemeen aanbevolen ras; B = beperkt aanbevolen ras; N = nieuw aanbevolen ras

²⁾ Een lage Pf/Pi-waarde betekent een hoge mate van resistentie.

³⁾ R = resistent tegen maiswortelknobbelaaltje (*M. chitwoodi*), Onderzoek op basis van tellingen van eiproppen.

⁴⁾ R = resistent tegen maiswortelknobbelaaltje (*M. chitwoodi*), Onderzoek op basis van tellingen van aanwezige aaltjes

⁵⁾ Het betreft Alternaria-soorten die alleen op kruisbloemigen voorkomen. Kans op overdracht van groenbemester op cultuurgewas is alleen aanwezig bij koolgewassen of koolzaad. O.a. bieten, aardappelen, uien en peen lopen geen gevaar, omdat het andere Alternaria-soorten betreft.

⁶⁾ Cijfer berust op oud onderzoek

Tabel 3. Bladrammenas - met resistentie tegen bietencystenaaltje (BCA 1)
geschikt voor uitzaai in het najaar (stoppelgewas)

Overzicht van de eigenschappen bij bladrammenassen

(gemiddelde resultaten over de jaren 2019 t/m 2024, proeven uitgevoerd op zandgrond in Zuidoost-Nederland en Oostelijk Flevoland).

Een hoog waarderingcijfer staat voor: vlotte grondbedekking, late bloei, weinig knolvorming, goede resistentie tegen *Alternaria*, goede hergroei na laat maaien en vorstgevoelig.

Rubricering ¹⁾	Rasnaam	Resistentie tegen het witte bietencystenaaltje ²⁾ (Pf/Pi-waarde)	Snelheid grondbedekking	Laatheid bloei	Mate van knol-ontwikkeling	Lengte (rel. 100 = 97 cm)	Resistentie tegen <i>Alternaria</i> ³⁾	Hergroei na laat maaien	Vorst gevoeligheid
A	Doublemax	< 0,1	8	8,5	8	116	7	6	7,5
A	Tiberius ⁴⁾	< 0,1	8	8,5	8	93	8	7	6
A	Adios	< 0,1 ⁵⁾	7,5	9	8,5	62	6	7,5	7,5
A	Final	< 0,1 ⁵⁾	7,5	9	8,5	63	6,5	7,5	7,5
A	Baracuda	< 0,1	7,5	8,5	7,5	85	8	7	6
A	Edwin	< 0,1	7,5	8,5	7,5	94	7	7	7
A	Reset	< 0,1	7,5	8,5	7,5	73	7	7	6,5
A	Colonel	< 0,1 ⁵⁾	8	7	8,5	137	8	6	7,5
A	Amigo	< 0,1	7,5	7	8,5	135	7,5	6,5	7,5
N	Marcus ⁴⁾	< 0,1	8	9	7,5	79	8	7	6

¹⁾ Rubricering: A = algemeen aanbevolen ras; B = beperkt aanbevolen ras; N = nieuw aanbevolen ras

²⁾ Een lage Pf/Pi-waarde betekent een hoge mate van resistentie.

³⁾ Het betreft *Alternaria*-soorten die alleen op kruisbloemigen voorkomen. Kans op overdracht van groenbemester op cultuurgewas is alleen aanwezig bij koolgewassen of koolzaad. O.a. bieten, aardappelen, uien en peen lopen geen gevaar, omdat het andere *Alternaria*-soorten betreft.

⁴⁾ Ras is nog in onderzoek voor resistentie tegen maiswortelknobbelaaltje (*M. chitwoodi*)

⁵⁾ Cijfer berust op oud onderzoek

Tabel 4. Bladrammenas - met resistentie tegen bietencystenaaltje (BCA 2)
geschikt voor uitzaai in het najaar (stoppelgewas)

Overzicht van de eigenschappen bij bladrammenasrassen

(gemiddelde resultaten over de jaren 2019 t/m 2024, proeven uitgevoerd op zandgrond in Zuidoost-Nederland en Oostelijk Flevoland).

Een hoog waarderingcijfer staat voor: vlotte grondbedekking, late bloei, weinig knolvorming, goede resistentie tegen Alternaria, goede hergroei na laat maaien en vorstgevoelig

Rubricering ¹⁾	Rasnaam	Resistentie tegen het witte bietencystenaaltje ²⁾ (Pf/Pi-waarde)	Snelheid grondbedekking	Laatheid bloei	Mate van knol-ontwikkeling	Lengte (relatief, 100 = 97 cm)	Resis-tentie tegen Alternaria ³⁾	Hergroei na laat maaien	Vorst gevoeligheid
B	Comet	0,1 - 0,3	7,5	8,5	8,5	117	8	6	7,5
B	Temuco	0,1 - 0,3	7,5	8,5	8,5	112	6,5	6	7
B	Tobarra	0,1 - 0,3	7,5	8	8,5	126	7,5	6,5	8
N	Viper	0,1 - 0,3	8	8,5	7,5	79	7	7,5	6,5

¹⁾ Rubricering: A = algemeen aanbevolen ras; B = beperkt aanbevolen ras; N = nieuw aanbevolen ras

²⁾ Een lage Pf/Pi-waarde betekent een hoge mate van resistentie.

³⁾ Het betreft Alternaria-soorten die alleen op kruisbloemigen voorkomen. Kans op overdracht van groenbemester op cultuurgewas is alleen aanwezig bij koolgewassen of koolzaad. O.a. bieten, aardappelen, uien en peen lopen geen gevaar, omdat het andere Alternaria-soorten betreft.

Tabel 5. Gele mosterd

Overzicht van de raseigenschappen (gemiddelde resultaten over de jaren 2019 t/m 2024, proeven uitgevoerd op zandgrond in Zuidoost- Nederland en Oostelijk Flevoland).
Een hoog waarderingcijfer staat voor: vlotte grondbedekking, late bloei, een stevig gewas en goede resistentie tegen Alternaria.

Rubricering ¹⁾	Rasnaam	Resistentie tegen het witte bietencystenaaltje ²⁾ (Pf/Pi-waarde)	Snelheid grondbedekking	Laatheld bloei	Lengte (relatief, 100 = 105 cm)	Stevig-heid	Resistentie tegen Alternaria ³⁾
A	Conceptone	<0,1	8	8,5	102	6	6,5
A	Victoria	<0,1	8	8,5	112	7	6,5
A	Fox	<0,1	8	8	97	8	7
A	Ultimo	0,1 - 0,3	8,5	8,5	98	7,5	7
A	Venice	0,1 - 0,3	8	9	93	8,5	7
A	Accent	0,1 - 0,3	8,5	8	110	7	7
A	Carline	0,1 - 0,3	8	8,5	100	8,5	6,5
A	Cezanne	0,1 - 0,3	8	8,5	95	8	7
A	Emilia	0,1 - 0,3	8	8,5	92	7,5	7
A	Floraine	0,1 - 0,3	8	8,5	93	7,5	7
A	Forenza	0,1 - 0,3	8	8,5	97	8,5	6,5
A	Iris	0,1 - 0,3	8	8,5	102	8	7
A	Odette	0,1 - 0,3	8	8,5	101	8,5	7
A	Passion	0,1 - 0,3	8	8,5	102	8	7
A	Saloon	0,1 - 0,3	8	8,5	112	7,5	7
A	Topas	0,1 - 0,3	8	8,5	100	7	7
A	Turbo	0,1 - 0,3	8	8,5	95	7	7
A	Vitaro	0,1 - 0,3	8	8,5	102	8	7
A	Architect	0,1 - 0,3	8	8	99	8,5	6,5
A	Panther	0,1 - 0,3	8	8	100	6,5	7
A	Lucida	0,1 - 0,3	7,5	8,5	96	8	7
N	Brisant	<0,1	7,5	8	101	8,5	7

¹⁾ Rubricering: A = algemeen aanbevolen ras; B = beperkt aanbevolen ras; N = nieuw aanbevolen ras.

²⁾ Een lage Pf/Pi-waarde betekent een hoge mate van resistentie.

³⁾ Het betreft Alternaria-soorten die alleen op kruisbloemigen voorkomen. Kans op overdracht van groenbemester op cultuurgewas is alleen aanwezig bij koolgewassen of koolzaad. O.a. bieten, aardappelen, uien en peen lopen geen gevaar, omdat het andere Alternaria-soorten betreft.

Tabel 6. Japanse haver

Overzicht van de raseigenschappen (gemiddelde resultaten over de jaren 2019 t/m 2024, proeven uitgevoerd op zandgrond in Zuidoost- Nederland en Oostelijk Flevoland).

Rubricering ¹⁾	Rasnaam	Vroegheid grondbedekking ²⁾	Laathheid bloei ³⁾	Lengte (vegetatief) ⁴⁾ (relatief, 100 = 63 cm)	Lengte (generatief) ⁵⁾ (relatief, 100 = 125 cm)	Gerstevergelingsvirus ⁶⁾	Meeldauw ⁷⁾
A	Vitaltop	8	8,5	94	102	7,5	7,5
A	Exito	7,5	8	103	104	8,5	7,5
A	Otex	7,5	7,5	108	101	8,5	7
A	Pratex	7,5	6,5	117	110	8	8,5
A	Vitalli	7,5	8	96	103	7,5	7,5
A	Tradex	7	7	107	107	8,5	7
A	Giraffe	7	6	113	109	8,5	8
A	Vitamos	7	9	98	92	8	6,5
A	Bristol	7	8,5	95	100	8	8
A	Silke	7	7,5	104	103	8	7
A	Codex	7	7	99	105	7,5	7,5
N	Rhino	7	9	94	98	7,5	8
N	Hippo	7	9	89	95	7,5	8

¹⁾ Rubricering: A = algemeen aanbevolen ras; B = beperkt aanbevolen ras; N = nieuw aanbevolen ras.

²⁾ 9 = zeer snel; 1 = zeer traag.

³⁾ 5 = vroeg in bloei; 9 = laat in bloei.

⁴⁾ vegetatief

⁵⁾ generatief

⁶⁾ 9 = geen aantasting; 1 = zeer zwaar aangetast.

⁷⁾ 9 = geen aantasting; 1 = zeer zwaar aangetast.