

Persbericht

Zoetermeer, 27 november 2025

Nieuwe aanbevolen rassen van suikerbieten

Er zijn 12 nieuwe suikerbietenrassen opgenomen in de Aanbevelende Rassenlijst voor 2026. Dit meldt de Commissie Samenstelling Aanbevelende Rassenlijst (CSAR), waarin BO Akkerbouw, Plantum en LTO-Nederland samenwerken.

De onderstaande rassen zijn opgenomen in de N-rubriek (nieuw aanbevolen rassen).
De cijfers in de verschillende tabellen zijn niet rechtstreeks vergelijkbaar.

Rassen voor de teelt op percelen met rhizoctonia

BTS 3690 RHC Kweker: Betaseed GmbH, Frankfurt am Main, Duitsland
Vertegenwoordiger: Betaseed, Dronten

Rassen voor de teelt op percelen met rhizoctonia en bietencysteaaltjes

Sallinia KWS Kweker: KWS SAAT SE & Co. KGaA, Einbeck, Duitsland
Vertegenwoordiger: KWS Benelux B.V., Roosendaal

Rassen voor de teelt op percelen met bietencysteaaltjes

Francina KWS Kweker: KWS SAAT SE & Co. KGaA, Einbeck, Duitsland
Vertegenwoordiger: KWS Benelux B.V., Roosendaal

BTS 2655 N Kweker: Betaseed GmbH, Frankfurt am Main, Duitsland
Vertegenwoordiger: Betaseed, Dronten

BTS 4200 N Kweker: Betaseed GmbH, Frankfurt am Main, Duitsland
Vertegenwoordiger: Betaseed, Dronten

Accelor Kweker: SESVanderHave N.V./S/A/, Tienen, België
Vertegenwoordiger: SESVanderHave Nederland B.V., Rilland

Rassen voor de teelt op percelen zonder rhizoctonia en bietencysteaaltjes

Lancelot Kweker: DLF Beet Seed ApS, Holeby, Denemarken
Vertegenwoordiger: DLF B.V., Kapelle

CSAR beslist over de samenstelling van de Aanbevelende Rassenlijst. Deskundigen van het bedrijfsleven bereiden de beslissingen inhoudelijk voor. Het onderzoek wordt gefinancierd door kweekbedrijven, telers en verwerkende industrie.

Meer informatie

Secretariaat CSAR: Frans Verwer, telefoon 06 - 81335633.

Publicatie van de tabellen is toegestaan, mits de gegevens integraal worden opgenomen en met bronvermelding "CSAR, Aanbevelende Rassenlijst 2026".

De onderstaande rassen zijn voor het eerst opgenomen in de B-rubriek (beperkt aanbevolen rassen).
De cijfers in de verschillende tabellen zijn niet rechtstreeks vergelijkbaar.

Rassen voor de teelt op percelen met rhizoctonia

Smart Blomma KWS Kweker: KWS SAAT SE & Co. KGaA, Einbeck, Duitsland
Vertegenwoordiger: KWS Benelux B.V., Roosendaal

Rassen voor de teelt op percelen met rhizoctonia en bietencysteaaltjes

Smart Jutta KWS Kweker: KWS SAAT SE & Co. KGaA, Einbeck, Duitsland
Vertegenwoordiger: KWS Benelux B.V., Roosendaal

Rassen voor de teelt op percelen met bietencysteaaltjes

Smart Justina KWS Kweker: KWS SAAT SE & Co. KGaA, Einbeck, Duitsland
Vertegenwoordiger: KWS Benelux B.V., Roosendaal

BTS Smart 6655 N Kweker: Betaseed GmbH, Frankfurt am Main, Duitsland
Vertegenwoordiger: Betaseed, Dronten

Rassen voor de teelt op percelen zonder rhizoctonia en zonder bietencysteaaltjes

Smart Enissa KWS Kweker: KWS SAAT SE & Co. KGaA, Einbeck, Duitsland
Vertegenwoordiger: KWS Benelux B.V., Roosendaal

CSAR beslist over de samenstelling van de Aanbevelende Rassenlijst. Deskundigen van het bedrijfsleven bereiden de beslissingen inhoudelijk voor. Het onderzoek wordt gefinancierd door kweekbedrijven, telers en verwerkende industrie.

Meer informatie

Secretariaat CSAR: Frans Verwer, telefoon 06 - 81335633.

Publicatie van de tabellen is toegestaan, mits de gegevens integraal worden opgenomen en met bronvermelding "CSAR, Aanbevelende Rassenlijst 2026".

Tabel 1: Overzicht van eigenschappen bij rhizoctoniaresistente suikerbietenrassen, bepaald op proefvelden met een risico op rhizoctoniabesmetting¹⁾

Rubricering ²⁾	Rasnaam	Waardering				Verhoudingsgetallen (gemiddeld 2022 - 2025) ³⁾							Rhizoctonia-resistentie ^{8,9)}	Aanvullende rhiz. resistentie ^{8, 10)}	Convviso One resistentie ¹¹⁾
		Vroegheid grondbedekking	Kophoogte ⁴⁾	Meegeleverde grond ⁵⁾	Bladgezondheid Cercospora ⁶⁾	K + Na	aminoN	Suikergehalte	WIN	Wortelopbrengst	Suikeropbrengst	Financiële opbrengst ⁷⁾			
A	Rentabla KWS	7	M	M	9	99	91	100	100	101	102	102	+		
A	BTS 4190 RHC	7	M	M	6	103	120	102	100	97	99	100	+		
A	Annemartha KWS	7,5	M	M	8	102	113	99	100	102	101	100	++	+/-	
N	BTS 3690 RHC	6,5	M	M	9	96	86	101	100	103	104	105	+/-		
B	Smart Blomma KWS	7	M	M	7	100	96	96	100	106	102	99	+		+
B	Lincoln	8	M	M	8	96	76	98	100	100	98	97	+		
B	BTS Smart 3905 RHC	6,5	M	M	6,5	103	96	96	100	101	97	94	+	+/-	+
B	Smart Liesa KWS	7	M	M	7,5	96	89	98	100	96	94	92	+	++	+
Rassen met tevens resistentie tegen bietencysteealtjes															
A	Fadela KWS	7,5	M	M	7,5	103	90	98	100	105	103	101	+	+/-	
N	Sallinia KWS	7,5	M	M	9	104	81	99	100	108	107	106	+	-	
B	Smart Jutta KWS	7,5	M	M	7	104	90	95	100	106	101	97	++	+/-	+

Hoge cijfers betekenen in het algemeen een gunstige waardering van de betrokken eigenschappen, behalve bij K+Na, aminoN en rhizoctonia-aantasting

¹⁾ De cijfers in deze tabel zijn niet vergelijkbaar met de cijfers in de rhizomanietabel. De genoemde rassen zijn onderzocht op proefvelden waar een risico is op rhizoctoniabesmetting. De resistentie tegen rhizoctonia is partieel, dat wil zeggen dat bij ernstige rhizoctoniabesmetting ook bij deze rassen rotte bieten kunnen optreden.

²⁾ Rubricering in de Rassenlijst: A = algemeen aanbevolen ras; N = nieuw aanbevolen ras; B = beperkt aanbevolen ras.

³⁾ De verhoudingsgetallen (100 =>) zijn gebaseerd op het gemiddelde van de rhizoctoniaresistente A- en N-rassen van rassenlijst 2025.

⁴⁾ Kophoogte: L = laag, M = gemiddeld en H = hoog boven de grond.

⁵⁾ Meegeleverde grond: L = weinig, M = gemiddeld en H = veel.

⁶⁾ Bladgezondheid cercospora (4 = laag t/m 9 = hoog)

⁷⁾ Voor de berekening van de financiële opbrengst zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: wortelopbrengst 85 ton/ha; suikergehalte 17%; aminoN 10 mmol/kg biet; K+Na 40 mmol/kg biet en meegeleverde grond 10%.

⁸⁾ Resistentie niveau: ++ = zeer goed; + = goed; +/- = matig

⁹⁾ Rhizoctonia klasseindeling: ≤ 2,7 = zeer goed; 2,8 - 3,0 = goed; ≥ 3,1 = matig

¹⁰⁾ Aanvullende resistentie tegen de AYPR- of een andere nieuwe variant van het rhizomanievirus

¹¹⁾ Tevens Convviso One resistentie

Tabel 2: Overzicht van eigenschappen bij suikerbietenrassen met resistentie tegen bietencystealtjes ¹⁾
(bepaald op proefvelden met bietencystealtjes)

		waardering				verhoudingsgetallen (gemiddeld 2022 - 2025) ³⁾									
Rubricering ²⁾	Rasnaam	Vroegheid grondbedekking	Kophoogte ⁴⁾	Meegeleverde grond ⁵⁾	Bladgezondheid cercospora ⁶⁾	K + Na	aminoN	Suikergehalte	WIN	Wortelopbrengst	Suikeropbrengst	Financiële opbrengst ⁷⁾	Aanvullende rhiz. resistentie ⁸⁾	Conviso One resistentie	
A	Leontina KWS	7,5	M	M	7	98	94	99	100	103	102	101	+		
A	Brumby	7	H	M	6	98	100	101	100	97	98	100	+/-		
A	BTS 1115 N	6,5	M	M	6,5	102	106	99	100	101	101	100			
N	Francina KWS	6	M	M	9	105	89	102	100	103	105	107	++		
N	BTS 2655 N	6,5	M	M	9	108	94	101	100	101	102	103	++		
N	BTS 4200 N	7	M	L	7,5	106	110	101	100	99	100	101			
N	Accelor	8,5	M	M	6,5	103	98	101	100	99	100	101			
B	Tessilia KWS	7,5	M	M	7	102	100	101	100	98	99	99	+		
B	Baltimore	7,5	M	M	7	97	107	102	100	94	96	97			
B	BTS Smart 6655 N	6,5	M	M	8,5	100	104	99	100	97	96	96			
B	Smart Justina KWS	7	M	M	6,5	99	102	98	100	98	96	95			
B	Jemina KWS ⁹⁾	7,5	M	H	8	90	86	97	100	95	92	90	+/-		
rassen met rhizoctonia- en bietencystealtjesresistentie															
N	Sallinia KWS	7,5	M	M	9	102	84	101	100	100	101	102			
B	Fadela KWS	7,5	M	M	7,5	104	94	99	100	97	96	95	+/-		
B	Smart Jutta KWS	7,5	M	M	7	101	100	97	100	97	94	92	+/-	+	

Hoge cijfers betekenen in het algemeen een gunstige waardering van de betrokken eigenschappen, behalve bij K+Na en aminoN.

¹⁾ De resistentie tegen bietencystealtjes is partieel, dat wil zeggen dat bij gebruik van deze rassen er nog wel vermeerdering van bietencystealtjes kan optreden.

²⁾ Rubricering in de Rassenlijst: A = algemeen aanbevolen ras; N = nieuw aanbevolen ras; B = beperkt aanbevolen ras.

³⁾ De verhoudingsgetallen (100 =) zijn gebaseerd op het gemiddelde van de A- en N-rassen van rassenlijst 2025.

⁴⁾ Kophoogte: L = laag, M = gemiddeld en H = hoog boven de grond.

⁵⁾ Meegeleverde grond: L = weinig, M = gemiddeld en H = veel.

⁶⁾ Bladgezondheid cercospora (4 = laag t/m 9 = hoog)

⁷⁾ Voor de berekening van de financiële opbrengst zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:
wortelopbrengst 85 ton/ha; suikergehalte 17%; aminoN 10 mmol/kg biet; K+Na 40 mmol/kg biet en meegeleverde grond 10%.

⁸⁾ Aanvullende resistentie tegen de AYPR- of een andere nieuwe variant van het rhizomanievirus.
Resistentie niveau: ++ = zeer goed; + = goed; +/- = voldoende

⁹⁾ Resistentie tegen *Meloidoayne chitwoodi* en *Meloidoayne fallax*

Tabel 3: Overzicht van eigenschappen bij rhizomanieresistente suikerbietenrassen voor de teelt op percelen zonder rhizoctonia en zonder bietencysteaaltjes (bepaald op proefvelden zonder besmetting met rhizoctonia en zonder bietencysteaaltjes)

Rubricering ¹⁾ Rasnaam	waardering				verhoudingsgetallen (gemiddeld 2022 - 2025) ²⁾							Aanvullende rhiz. resistentie ⁷⁾	Conviso One resistentie ⁸⁾
	Vroegheid grondbedekking	Kophoogte ³⁾	Meegeleverde grond ⁴⁾	Bladgezondheid cercospora ⁵⁾	K + Na	aminoN	Suikergehalte	WIN	Wortelopbrengst	Suikeropbrengst	Financiële opbrengst ⁶⁾		
A Jewel	7	H	L	6	103	102	100	100	99	99	101		
A Leontina KWS ^{bcaR}	7,5	M	H	7	99	97	98	100	105	103	101	+	
A Yukon	7,5	H	L	5,5	102	102	100	100	99	99	100	+/-	
A Tessilia KWS ^{bcaR}	7,5	M	M	7	105	99	99	100	101	101	100		
A Mertha KWS	7	L	M	6	93	103	103	100	94	97	99	+/-	
N Lancelot	8,5	M	L	7	103	101	100	100	99	99	100		
B Brumby ^{bcaR}	7	H	L	6	104	102	100	100	99	98	99	+/-	
B ST Rotterdam	8,5	H	L	8	101	92	96	100	105	101	99		
B Francina KWS ^{bcaR}	6	M	M	9	106	93	99	100	100	99	98	++	
B BTS 3835	7	M	M	7,5	100	82	98	100	100	98	98	+/-	
B BTS 2090	8	M	M	7	107	106	101	100	95	96	97		
B BTS 4200 N ^{bcaR}	7	M	M	7,5	108	114	100	100	98	97	97		
B BTS 2620	8,5	M	M	9	108	101	95	99	105	100	97	+/-	
B Smart Enissa KWS	7	M	M	6,5	94	100	101	100	93	94	94		+
B Jemina KWS ^{bcaR}	8	M	H	8	89	90	97	100	99	96	94	+/-	
B Smart Justina KWS ^{bcaR}	7	M	M	6,5	102	110	97	100	99	97	94		+
B BTS Smart 6655 N ^{bcaR}	6,5	M	M	8,5	100	112	97	100	95	93	91		+
gemiddelde van de rhizoctonia rassen					103	115	100	100	93	93	93		
Hoge cijfers betekenen in het algemeen een gunstige waardering van de betrokken eigenschappen, behalve bij K+Na en aminoN ^{bcaR} = Bietencysteaaltjesresistent ¹⁾ Rubricering in de Rassenlijst: A = algemeen aanbevolen ras; N = nieuw aanbevolen ras; B = beperkt aanbevolen ras. ²⁾ De verhoudingsgetallen (100 =) zijn gebaseerd op het gemiddelde van de A- en N-rassen van rassenlijst 2025. ³⁾ Kophoogte: L = laag, M = gemiddeld en H = hoog boven de grond. ⁴⁾ Meegeleverde grond: L = weinig, M = gemiddeld en H = veel. ⁵⁾ Bladgezondheid cercospora (4 = laag t/m 9 = hoog) ⁶⁾ Voor de berekening van de financiële opbrengst zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: wortelopbrengst 85 ton/ha; suikergehalte 17%; aminoN 10 mmol/kg biet; K+Na 40 mmol/kg biet en meegeleverde grond 10%. ⁷⁾ Aanvullende resistentie tegen de AYPR- of een andere nieuwe variant van het rhizomanievirus. Resistentie niveau: ++ = zeer goed; + = goed; +/- = voldoende ⁸⁾ Tevens Conviso One resistentie ⁹⁾ Resistentie tegen <i>Meloidogyne chitwoodi</i> en <i>Meloidogyne fallax</i>													