

Persbericht

Zoetermeer, 05 oktober 2026

Nieuwe aanbevolen rassen voor voedergrassen

De Commissie Samenstelling Aanbevelende Rassenlijst (CSAR) heeft besloten om 10 nieuwe rassen van Engels raaigras, voedertype, op te nemen op de Aanbevelende Rassenlijst 2027.

De rassen zijn voor het eerst opgenomen in de N-rubriek (nieuw aanbevolen). De eigenschappen staan vermeld in de bijlage.

Engels raaigras – middentijds doorschietend (laat hooitype) – diploïde rassen

Barsnip	kweker: Barenbrug Holland B.V., Nijmegen
Senator	kweker: DSV zaden Nederland B.V., Gennep
Agrikal	kweker: RAGT 2n S.A.S. Rodez (FR) vertegenwoordiger: Vandinter Semo B.V., Scheemda
Kalimba	kweker: RAGT 2n S.A.S. Rodez (FR) vertegenwoordiger: Limagrain Nederland B.V., Rilland

Engels raaigras – laat doorschietend (weidetype) – diploïde rassen

Yoda	kweker: DLF A/S, Roskilde (DK) vertegenwoordiger: DLF B.V. Kapelle
Meldade	kweker: ILVO – Plant, Melle (B) vertegenwoordiger: DLF B.V. Kapelle

Engels raaigras – middentijds doorschietend (laat hooitype) – tetraploïde rassen

Evenza	kweker: ILVO – Plant, Melle (B) vertegenwoordiger: DSV zaden Nederland B.V., Gennep
---------------	--

Engels raaigras – laat doorschietend (weidetype) – tetraploïde rassen

Meltosca	kweker: ILVO – Plant, Melle (B) vertegenwoordiger: DLF B.V. Kapelle
Melfar	kweker: ILVO – Plant, Melle (B) vertegenwoordiger: DLF B.V. Kapelle
Rotiva	kweker: DSV zaden Nederland B.V., Gennep

CSAR beslist over de samenstelling van de Aanbevelende Rassenlijst. De beslissingen worden inhoudelijk voorbereid door deskundigen van het bedrijfsleven.

Meer informatie:

Secretariaat CSAR: Frans Verwer, telefoon 06 - 81 33 56 33

Publicatie van de tabel is toegestaan, mits de gegevens integraal worden opgenomen en met bronvermelding "CSAR, Aanbevelende Rassenlijst 2027".

Tabel 1. Engels raaigras - middentijds doorschietend diploïde rassen

Overzicht van de raseigenschappen (gemiddelde resultaten). Een hoog cijfer duidt op een gunstige waardering van de betreffende eigenschap. De relatieve opbrengstcijfers zijn vanwege verschillen in opbrengstniveau alleen per tabel en per kolom direct vergelijkbaar.

Rubricering	Rasnaam 1)	Gemiddelde doorschietdatum	Standvastigheid	Wintervastheid	Resistentie tegen kroon-roest	Droge stofopbrengst (relatief) van de eerste snede	Droge stofopbrengst (relatief) van de tweede snede	Droge stofopbrengst (relatief) Gemiddelde van maaiproeven	Droge stofopbrengst (relatief) Gemiddelde van beweideproefvelden
	Diploïde rassen								
N	Bartui	20-mei	8,1		8,4	107	102	103	103
	Barriot	21-mei	7,7	7,1	8,1	110	85	100	97
	Barmazing	21-mei	8,0	7,4	8,6	106	99	105	105
N	Barsnip	22-mei	8,1		8,6	103	93	99	101
	Armetto	22-mei	8,2	7,6	8,0	103	96	98	97
	Arelio	22-mei	8,0	7,4	7,5	99	97	99	99
	Barcrement	23-mei	8,2	6,7	7,8	99	100	98	100
	Meltruck	23-mei	8,6		8,1	98	97	100	99
	Probus	24-mei	8,0		7,3	103	100	101	99
N	Senator	24-mei	8,5		8,8	101	90	100	101
N	Grazeon	24-mei	8,3		8,0	96	105	99	101
	Melspring	25-mei	8,2	6,9	7,2	103	94	97	96
	Barround	25-mei	8,3	7,1	8,7	98	106	101	102
	Maqui	25-mei	8,3	7,3	8,2	92	99	95	96
	Sputnik	26-mei	8,1	6,6	8,3	102	102	102	100
	Norwich	26-mei	8,1		7,6	100	102	103	102
	Barlevel	27-mei	8,3		8,4	101	101	98	98
N	Agrikal	27-mei	8,6		8,8	96	102	101	102
N	Novix	28-mei	8,3		8,8	95	95	97	99
N	Kalimba	28-mei	8,4		8,8	91	101	99	98
	Arnando	29-mei	8,4	7,5	7,8	91	102	98	100
N	Scartorp	30-mei	8,1		8,3	93	111	98	98
	100 = ton ds/ha					3,5	2,8	12,5	11,5

¹⁾ Rassen staan gerangschikt op volgorde van vroegheid (op basis van kolom gemiddelde doorschietdatum). Rassen die 1, 2 of 3 jaar op de lijst staan, zijn aangeduid met een N - Nieuw Aanbevolen.

Tabel 2. Engels raaigras - laat doorschietend - diploïde rassen

Overzicht van de raseigenschappen (gemiddelde resultaten). Een hoog cijfer duidt op een gunstige waardering van de betreffende eigenschap. De relatieve opbrengstcijfers zijn vanwege verschillen in opbrengstniveau alleen per tabel en per kolom direct vergelijkbaar.

Rubricering	Rasnaam ¹⁾	Gemiddelde doorschietdatum	Standvastigheid	Wintervastheid	Resistentie tegen kroon-roest	Droge stofopbrengst (relatief) van de eerste snede	Droge stofopbrengst (relatief) van de tweede snede	Droge stofopbrengst (relatief) Gemiddelde van maaiproeven	Droge stofopbrengst (relatief) Gemiddelde van beweidingsproefvelden
N	Diploïde rassen								
	Barpendel	31-mei	8,2		8,3	109	99	103	103
	Maidstone	31-mei	8,3		8,7	105	97	94	99
	Maiko	1-jun	8,4	7,4	7,7	98	102	100	101
	Barathon	2-jun	8,5		8,0	106	99	102	102
	Fabrizio	2-jun	8,4		8,1	106	98	99	98
	Swan	2-jun	8,4	7,5	8,2	102	97	101	101
	Barbitol	2-jun	8,3	6,9	8,2	97	105	101	100
	Manchester	2-jun	8,2	7,4	8,2	94	102	99	99
	Melonora	2-jun	8,5	7,0	8,0	94	102	100	98
	Barspring	3-jun	8,0	7,3	7,0	93	103	100	97
	Molner	4-jun	8,1		8,7	93	102	101	100
N	Yoda	5-jun	8,4		8,5	104	99	99	107
N	Barhoney	5-jun	8,3	7,2	7,7	98	97	100	99
	Meldade	5-jun	8,7		8,8	96	100	104	103
	Rossimonte	6-jun	8,2	6,8	7,8	98	101	101	100
	100 = ton ds/ha					2,9	3,1	12,0	11,2

¹⁾ Rassen staan gerangschikt op volgorde van vroegheid (op basis van kolom gemiddelde doorschietdatum). Rassen die 1, 2 of 3 jaar op de lijst staan, zijn aangeduid met een N - Nieuw Aanbevolen.

Tabel 3. Engels raaigras - middentijds doorschietend – tetraploïde rassen

Overzicht van de raseigenschappen (gemiddelde resultaten). Een hoog cijfer duidt op een gunstige waardering van de betreffende eigenschap. De relatieve opbrengstcijfers zijn vanwege verschillen in opbrengstniveau alleen per tabel en per kolom direct vergelijkbaar.

Rubricering	Rasnaam ¹⁾	Gemiddelde doorschietdatum	Standvastigheid	Wintervastheid	Resistentie tegen kroon-roest	Droge stofopbrengst (relatief) van de eerste snede	Droge stofopbrengst (relatief) van de tweede snede	Droge stofopbrengst (relatief) Gemiddelde van maaiproeven	Droge stofopbrengst (relatief) Gemiddelde van beweidingproefvelden
	Tetraploïde rassen								
	Astrian	19-mei	7,8		8,5	116	86	100	101
	Explosion	22-mei	8,0	7,3	8,1	106	87	93	96
	Baranova	23-mei	7,7	7,4	8,3	110	93	100	99
	Memisa	24-mei	8,2	7,5	8,5	104	94	98	97
N	Evenza	25-mei	8,5		9,0	99	96	100	102
	Wappo	25-mei	8,4	7,5	8,0	98	99	99	100
	Barojet	26-mei	8,1	7,6	7,7	96	106	100	99
	Barleffe	27-mei	7,8	7,4	8,6	100	97	97	97
	Melforce	27-mei	8,3	7,9	8,2	98	99	99	102
	Mons	28-mei	7,9		8,5	99	102	102	103
N	Barrialto	28-mei	7,9		9,0	98	102	101	99
	Melville	28-mei	8,4	7,4	8,6	94	101	97	101
	Briant	29-mei	8,0	7,5	8,2	100	99	98	99
N	Evention	29-mei	8,2		8,3	95	98	99	98
N	Barbrisk	29-mei	8,3		9,0	95	102	100	96
N	Meltio	30-mei	8,6		8,8	103	106	105	106
	Barclima	30-mei	8,2	7,3	7,9	97	109	100	96
	100 = ton ds/ha					3,6	2,9	12,9	11,5

¹⁾ Rassen staan gerangschikt op volgorde van vroegheid (op basis van kolom gemiddelde doorschietdatum).
Rassen die 1, 2 of 3 jaar op de lijst staan, zijn aangeduid met een N - Nieuw Aanbevolen.

Tabel 4. Engels raaigras - laat doorschietend - tetraploïde rassen

Overzicht van de raseigenschappen (gemiddelde resultaten). Een hoog cijfer duidt op een gunstige waardering van de betreffende eigenschap. De relatieve opbrengstcijfers zijn vanwege verschillen in opbrengstniveau alleen per tabel en per kolom direct vergelijkbaar.

Rubricering	Rasnaam 1)	Gemiddelde doorschietdatum	Standvastigheid	Wintervastheid	Resistentie tegen kroon-roest	Droge stofopbrengst (relatief) van de eerste snede	Droge stofopbrengst (relatief) van de tweede snede	Droge stofopbrengst (relatief) Gemiddelde van maaiproeven	Droge stofopbrengst (relatief) Gemiddelde van beweidingsproefvelden
	Tetraploïde rassen								
	Mercule	31-mei	8,3	7,9	8,3	103	98	103	102
	Salvina	31-mei	8,3	7,7	8,0	102	98	99	100
	Melsago	31-mei	8,1	7,5	7,8	99	101	100	101
	Barganza	1-jun	7,8	8,0	7,0	105	102	101	100
N	Meltosca	1-jun	8,5		8,6	102	98	101	99
	Neuville	1-jun	8,0	7,7	8,2	100	102	101	98
N	Champus	1-jun	8,3		8,6	100	100	100	101
N	Melfar	1-jun	8,6		8,4	99	97	99	101
	Thegn	1-jun	8,1	7,9	8,1	98	100	99	99
	Melkana	2-jun	8,3	7,4	7,9	96	105	99	100
N	Rotiva	3-jun	8,2		8,4	100	102	101	99
	Melfix	3-jun	8,2	7,4	7,9	97	97	99	99
	Beau	3-jun	8,2	7,8	8,1	97	102	100	99
	Melbolt	3-jun	8,2	7,1	7,5	96	100	97	100
	100 = ton ds/ha					3,2	3,0	12,5	11,1

- 1) Rassen staan gerangschikt op volgorde van vroegheid (op basis van kolom gemiddelde doorschietdatum). Rassen die 1, 2 of 3 jaar op de lijst staan, zijn aangeduid met een N - Nieuw Aanbevolen.