

Nieuwe aanbevolen rassen van cichorei

Er worden drie nieuwe cichoreirassen opgenomen in de Aanbevelende Rassenlijst voor 2016. Dit meldt de Commissie Samenstelling Aanbevelende Rassenlijst (CSAR), waarin de Brancheorganisatie Akkerbouw, Plantum en LTO-Nederland samenwerken.

De onderstaande rassen zijn opgenomen in de N-rubriek (nieuw aanbevolen). De eigenschappen staan vermeld in de bijlage.

Larigot	Kweker: Chicoline (Division of Warcoing S.A.), Warcoing (B) en ILVO - Plant, Melle (B)
Goldine	Kweker: S.A. Florimond Desprez Veuve et Fils, Cappelle-en-Pévèle (F) Vertegenwoordiger: Erauw Holland B.V., Breda
Benulite	Kweker: S.A. Florimond Desprez Veuve et Fils, Cappelle-en-Pévèle (F) Vertegenwoordiger: Erauw Holland B.V., Breda

CSAR beslist over de samenstelling van de Aanbevelende Rassenlijst. Deskundigen van het bedrijfsleven bereiden de beslissingen inhoudelijk voor. Dit gebeurt in de Werkgroep Rassenonderzoek Cichorei die onderdeel uitmaakt van de Stichting Bevordering Cichoreiteelt.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met David Kasse, secretaris van CSAR, telefoon 079 – 30 30 333 of 06 - 52 06 43 26.

Publicatie van de tabel is toegestaan, mits de gegevens integraal worden opgenomen en met bronvermelding 'CSAR, Aanbevelende Rassenlijst 2016'.

Tabel. Overzicht van eigenschappen, opbrengsten en gehalten van cichoreirassen.
Gemiddelden over de jaren 2010 t/m 2015¹⁾

Rubricering ²⁾	Rasnaam	Vroegheid grondbedekking	Schietresistentie	Wortelopbrengst	Inulinegetal	Inulineopbrengst	Financiële opbrengst ³⁾
A	Selenite	7	8	101	99	100	100
A	Fugato	6	8,5	99	100	100	100
B	Bronze	7,5	6	99	101	100	100
B	Saponite	7	6,5	97	100	98	97
B	Diabolus	6,5	7,5	96	99	95	96
N	Maestoso	6,5	9	102	101	103	103
N	Larigot	7	9	100	101	101	101
Rassen met schietergevoeligheid⁴⁾							
B	Melci	7	4	97	100	97	97
N	Goldine	7,5	5,5	104	99	103	103
Rassen met een speciale eigenschap⁵⁾							
B	Chrysolite ⁴⁾	7,5	3,5	92	99	91	91
N	Benulite	7,5	6,5	98	100	98	98
100 = ..ton/ha, -, ton/ha, euro/ha				58,4	17,6	10,3	3758

1) Vroegheid grondbedekking en schietresistentie zijn weergegeven in waarderingscijfers. Hoge waarderingscijfers betekenen vroege grondbedekking en goede schietresistentie. Opbrengsten en inulinegetal zijn weergegeven in verhoudingsgetallen.

2) Rubricering op de Rassenlijst 2016: A = Algemeen aanbevolen ras, B = Beperkt aanbevolen ras, N = Nieuw aanbevolen ras.

3) Berekend op basis van € 83,50 per ton netto cichorei en € 0,46 per ton cichorei per 0,1 punt lager of hoger inulinegetal dan 17; uitgangssituatie: 45 ton netto cichorei met 17,0% inuline; er is geen rekening gehouden met grondtarra.

4) Rassen met een resistentie tegen schietervorming die lager is dan 6, worden in een aparte categorie geplaatst. Aanbevolen wordt om deze rassen niet te vroeg te zaaien. Het N-ras Goldine is voorlopig ingedeeld in deze categorie.

5) Chrysolite en Benulite zijn rassen met een specifieke tolerantie tegen sulfonyl-urea herbiciden die in cichorei zijn toegelaten.