

Nieuwe cijfers cichoreirassen

Er worden geen nieuwe rassen van cichorei opgenomen op de Aanbevelende Rassenlijst voor 2017. Wel zijn de cijfers en de rubricering van de aanbevolen rassen geactualiseerd.

Dit meldt de Commissie Samenstelling Aanbevelende Rassenlijst (CSAR), waarin de Brancheorganisatie Akkerbouw, Plantum en LTO-Nederland samenwerken.

CSAR beslist over de samenstelling van de Aanbevelende Rassenlijst. Deskundigen van het bedrijfsleven bereiden de beslissingen inhoudelijk voor. Dit gebeurt in de Werkgroep Rassenonderzoek Cichorei die onderdeel uitmaakt van de Stichting Bevordering Cichoreiteelt.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met David Kasse, secretaris van CSAR, telefoon 079 – 30 30 333 of 06 - 52 06 43 26.

Publicatie van de tabel is toegestaan, mits de gegevens integraal worden opgenomen en met bronvermelding 'CSAR, Aanbevelende Rassenlijst 2017'.

Tabel. Overzicht van eigenschappen, opbrengsten en gehalten van cichoreirassen.
Gemiddelden over de jaren 2011 t/m 2016¹⁾

Rubricering ²⁾	Rasnaam	Vroegheid grondbedekking	Schietresistentie ⁴⁾	Wortelopbrengst	Inulinegetal	Inulineopbrengst	Financiële opbrengst ³⁾
A	Maestoso	6,5	9	102	101	102	102
A	Fugato	6	8,5	98	100	98	98
A	Selenite	7	8	99	99	98	98
B	Saponite	7	6,5	96	100	96	96
B	Diabolus	6,5	7,5	94	99	93	93
N	Goldine	7,5	6,5	101	99	101	101
N	Larigot	7	9	100	101	101	100
Rassen met een specifieke herbicidetolerantie⁵⁾							
B	Chrysolite	7,5	3,5	91	99	90	90
N	Benulite	7,5	6,5	98	100	97	98
100 = ..ton/ha, -, ton/ha, euro/ha				61,0	17,8	10,9	3757

¹⁾ Vroegheid grondbedekking en schietresistentie zijn weergegeven in waarderingscijfers. Hoge waarderingscijfers betekenen vroege grondbedekking en goede schietresistentie. Opbrengsten en inulinegetal zijn weergegeven in verhoudingsgetallen.

²⁾ Rubricering op de Rassenlijst 2017: A = Algemeen aanbevolen ras, B = Beperkt aanbevolen ras, N = Nieuw aanbevolen ras.

³⁾ Berekend op basis van € 83,50 per ton netto cichorei en € 0,46 per ton cichorei per 0,1 punt lager of hoger inulinegetal dan 17,0; uitgangssituatie: 45 ton netto cichorei met 17,0% inuline; er is geen rekening gehouden met grondtarra.

⁴⁾ Aanbevolen wordt om rassen met een resistentie tegen schietervorming die lager is dan 6, niet te vroeg te zaaien.

⁵⁾ Chrysolite en Benulite zijn rassen met een specifieke tolerantie tegen sulfonyl-urea herbiciden die in cichorei zijn toegelaten.