

Nieuw aanbevolen rassen van wintertarwe

Er zijn 3 nieuwe rassen van wintertarwe opgenomen in de Aanbevelende Rassenlijst voor 2015. Dit meldt de Commissie Samenstelling Aanbevelende Rassenlijst (CSAR) waarin het Productschap Akkerbouw, Plantum NL en LTO-Nederland samenwerken.

Onderstaande rassen zijn voor het eerst opgenomen in de N-rubriek (nieuw aanbevolen). De eigenschappen van de rassen staan vermeld in de bijlage.

Anapolis kweker: Nordsaat Saatzucht GmbH, Böhnshausen (D)
vertegenwoordiger : Barenbrug Holland B.V., Nijmegen

KWS Livius kweker: KWS Lochow GmbH, Bergen (D)
vertegenwoordiger: Wiersum Plantbreeding B.V., Winschoten

Mediator kweker: GIE Unisigma, Froissy (F)
vertegenwoordiger: Limagrain Nederland B.V., Rilland

De stopzetting in 2014 van de financiële bijdrage van het Productschap Akkerbouw, die gebaseerd was op een heffing bij akkerbouwers, heeft ertoe geleid dat in 2014 gekozen is voor een beperktere opzet van het rassenonderzoek in wintertarwe. De financiering daarvan komt geheel ten laste van de kwekers. Het onderzoek op zand- en dalgrond, rivierklei en löss is stopgezet. Daarnaast is ook het aantal proeven zonder ziektebestrijding verminderd. Om die reden bevatten de tabellen in de bijlage minder gegevens dan tot nu toe gebruikelijk was.

CSAR beslist over de samenstelling van de Aanbevelende Rassenlijst. De beslissingen worden inhoudelijk voorbereid door deskundigen van het bedrijfsleven in zes gewaswerkgroepen. Met het bijbehorende onderzoek is jaarlijks ruim 1 miljoen euro gemoeid.

Meer informatie:

Secretariaat CSAR: David Kasse, telefoon 079 – 368 7523 of 06 – 52 06 43 26

Publicatie van de tabellen is toegestaan, mits de gegevens integraal worden opgenomen met bronvermelding 'CSAR, Aanbevelende Rassenlijst 2014'.

Tabel 1. Overzicht van de raseigenschappen bij wintertarwe

Gemiddelde resultaten over de jaren 2011 t/m 2014

Rubricering ¹⁾	Rasnaam					Resistentie tegen						Bakkwaliteit ²⁾				Classificatie
		Lengte stro (rel.)	Stevigheid	Vroegheid aar	Vroegrijpheid	Schot	Gele roest	Bruine roest	Meeldauw	Bladvlekkenziekte	Fusarium in de aar	Broodkwaliteit	Deegkwaliteit	Zelenywaarde	Korrelhardheid	
Baktarwe																
A	Julius	104	8,0	6,0	5,5	7,0	8,5	7,5	7,0	8,5	6,5	7,5	6,5	8,0	8,0	B
A	Kelvin	98	7,5	7,0	6,5	7,0	8,0	9,0	7,5	7,5	6,5	7,5	6,5	7,0	7,0	B
N	KWS Livius	108	7,5	6,5	6,5	5,5	9,0	7,0	6,0	8,5	7,0	7,5	7,0	8,0	8,0	B
B	Lincoln	89	8,0	6,5	6,0	7,5	7,0	7,5	7,5	7,0	6,5	-	-	-	-	B
B	SW Tataros	100	7,0	6,5	7,5	7,5	8,5	6,5	6,5	6,0	6,5	-	-	-	-	B
Vultarwe																
A	Alves	104	7,0	7,0	7,5	7,0	8,5	7,5	7,0	7,0	6,5	6,5	5,5	6,5	7,0	Vu
Overige tarwe																
A	Amalia	101	8,5	6,0	5,5	7,0	7,5	8,5	7,5	8,0	7,0					
A	Delmare	97	7,0	7,0	6,5	7,0	7,5	7,5	7,5	6,0	6,5					
A	Henrik	102	7,5	6,5	7,5	7,0	8,5	7,5	7,5	7,0	7,0					
A	Tabasco	95	7,5	5,5	5,5	6,5	8,5	8,5	8,5	8,0	6,5					
N	Anapolis	96	6,5	6,5	6,5	6,5	9,0	8,0	8,5	7,5	7,0					
N	Mediator	96	8,0	7,5	7,0	6,5	8,0	8,0	7,5	7,0	7,0					
B	Elixer	101	5,5	7,0	6,5	6,5	8,5	7,0	7,0	7,5	7,0					
B	Homeros	93	6,5	7,0	6,5	7,0	6,5	8,0	8,5	8,0	5,5					
B	KWS Erasmus	97	7,0	6,0	6,5	6,0	8,5	7,5	7,5	7,5	7,0					
B	Lear	99	6,5	5,0	5,5	6,0	6,0	8,5	8,0	7,5	6,0					
Twee jaar onderzocht																
	Benchmark	101	7,5	7,0	6,5	6,5	8,5	7,0	7,5	7,5	6,5					
	Johnny	103	7,5	6,5	7,0	5,0	8,5	8,0	8,5	7,0	6,5	(6.0)	(5.5)	(5.5)	(3.5)	(Ov)
	Memory	93	8,5	6,5	6,5	6,5	8,5	8,5	8,5	7,5	6,0	(6.5)	(6.0)	(7.0)	(7.5)	(Vu)
	RGT Reform	93	8,0	6,5	7,0	7,0	8,5	8,0	7,5	7,5	7,0	(7.5)	(9.0)	(8.0)	(7.0)	(B)
100 = .. cm		90,3														

*: Een hoog cijfer duidt op een gunstige waardering van de betrokken eigenschap

¹⁾ Rubricering conform de Aanbevelende Rassenlijst 2015: A = Algemeen aanbevolen ras; B = Beperkt aanbevolen ras; N = Nieuw aanbevolen ras.

²⁾ Tussen haakjes: voorlopige gegevens; - : geen cijfers beschikbaar uit het huidige bakkwaliteitsonderzoek, classificatie gebaseerd op onderzoek dat in het verleden is uitgevoerd; B = baktarwe; Vu = vultarwe; Ov = overige tarwe; bij korrelhardheid betekent een cijfer hoger dan 5: een harde tarwe

Tabel 2. Overzicht van korrelopbrengsten bij wintertarwe per regio
gemiddelde resultaten over de jaren 2009 t/m 2014 in verhoudingsgetallen

		Zonder ziektebestrijding			Met ziektebestrijding		
		Noordelijke Zeeklei	Centrale Zeeklei	Zuidwestelijke Zeeklei	Noordelijke Zeeklei	Centrale Zeeklei	Zuidwestelijke Zeeklei
Baktarwe							
A	Julius	102	101	98	100	101	98
A	Kelvin	100	100	103	98	97	99
N	KWS Livius	107	102	103	100	100	100
B	Lincoln	98	96	94	95	99	98
B	SW Tataros	90	91	92	95	92	94
Vultarwe							
A	Alves	100	99	99	101	99	99
Overige tarwe							
A	Amalia	102	104	104	100	101	102
A	Delmare	97	94	96	102	100	101
A	Henrik	99	100	100	100	100	102
A	Tabasco	100	103	100	100	102	100
N	Anapolis	104	100	104	103	100	104
N	Mediator	101	96	102	104	101	104
B	Elixer	102	102	100	101	101	103
B	Homeros	103	101	100	100	100	100
B	KWS Erasmus	102	103	99	103	102	100
B	Lear	99	94	91	99	99	101
Twee jaar onderzocht							
	Benchmark	109	110	105	107	108	107
	Johnny	103	102	103	100	102	102
	Memory	105	103	98	100	98	95
	RGT Reform	107	101	103	102	98	101
100 = ..ton/ha		10,4	10,2	10,2	11,7	11,8	11,6

De verhoudingsgetallen in het gedeelte met ziektebestrijding zijn niet rechtstreeks te vergelijken met de verhoudingsgetallen in het gedeelte zonder ziektebestrijding.