

Nieuwe cijfers zomertarwerassen

Er worden geen nieuwe rassen van zomertarwe opgenomen op de Aanbevelende Rassenlijst voor 2013. Wel zijn de cijfers en de rubricering van de aanbevolen rassen geactualiseerd. Dit meldt de Commissie Samenstelling Aanbevelende Rassenlijst (CSAR), waarin het Productschap Akkerbouw, Plantum en LTO-Nederland samenwerken.

CSAR beslist over de samenstelling van de Aanbevelende Rassenlijst. Deskundigen van het bedrijfsleven bereiden de beslissingen inhoudelijk voor. Dit gebeurt in zeven gewaswerkgroepen.

De raseigenschappen worden toegelicht in de bijlage.

Meer informatie

Secretariaat CSAR: David Kasse, telefoon 079 – 368 7523 of 06 – 52 06 43 26

Publicatie van de tabel is toegestaan, mits de gegevens integraal worden opgenomen en met bronvermelding 'CSAR, Aanbevelende Rassenlijst 2013'.

Tabel. Overzicht van raseigenschappen bij zomertarwe

Gemiddelde resultaten over de jaren 2005 t/m 2012 voor de raseigenschappen en de jaren 2011 en 2012 voor de korrelopbrengst ¹⁾

Rubricering ²⁾	Rasnaam	Lengte van het stro	Stevigheid van het stro	Vroegheid in de aar komen	Vroegrijpheid	Resistentie tegen:				Korrelopbrengst (relatief)			
						Schot	Bruine roest	Meeldauw	Bladvlekkenziekte	kleigrond		zand- en dalgrond	
										Met ziektenbestrijding	Zonder ziektenbestrijding	Met ziektenbestrijding	Zonder ziektenbestrijding
A	Tybalt	96	7	6,5	7	8	6	8,5	6	100	104	104	101
A	Trappe	104	7,5	6,5	6	8	8	6,5	7,5	100	96	96	99
Ras in onderzoek (2 jaar)													
	Quintus	101	6	7	7	5	7,5	7,5	7,5	107	110	110	112
100 = cm; ton/ha		93								8,8	7,7	8,1	7,8

¹⁾ Lengte van het stro en korrelopbrengsten zijn weergegeven in verhoudingsgetallen. Hoge waarderingscijfers betekenen goede stevigheid van het stro, vroeg in de aar komen, vroeg rijp en goede resistenties.

²⁾ Rubricering op de Rassenlijst 2013: A = Algemeen aanbevolen ras.