

Nieuw aanbevolen ras van zomergerst

Er wordt een nieuw zomergerstras opgenomen op de Aanbevelende Rassenlijst voor 2018. Dit meldt de Commissie Samenstelling Aanbevelende Rassenlijst (CSAR), waarin de Brancheorganisatie Akkerbouw, Plantum en LTO-Nederland samenwerken.

Het gaat om het volgende ras, dat voor het eerst is opgenomen in de N-rubriek (nieuw aanbevolen rassen) van brouwgerstrassen. De eigenschappen van de aanbevolen rassen staan vermeld in de tabel.

Laureate Kweker: Syngenta Seeds Ltd., Market Rasen (UK)
 Vertegenwoordiger: Top-Seeds, Apeldoorn

CSAR beslist over de samenstelling van de Aanbevelende Rassenlijst. Deskundigen van het bedrijfsleven bereiden de beslissingen inhoudelijk voor. Dit gebeurt in een gewaswerkgroep.

Meer informatie

Secretariaat CSAR: David Kasse, telefoon 079 - 30 30 333 of 06 - 52 06 43 26

Publicatie van de tabel is toegestaan, mits de gegevens integraal worden opgenomen en met bronvermelding 'CSAR, Aanbevelende Rassenlijst 2018'.

Tabel. Overzicht van eigenschappen bij zomergerst Aanbevelende Rassenlijst 2018 ¹⁾

| Rubricering ²⁾ | Rasnaam | Lengte van het stro Stevigheid van het stro Vroegheid in de aar komen Vroegrijpheid | | | | Resistentie tegen: | | | | Korrelopbrengst kleigrond | | Korrelopbrengst zand- en dalgrond | | Kwaliteitsgegevens | | | |
|-------------------------------------|------------|--|-----|-----|-----|--------------------|------------------|-------------------|------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------|--------------|----------------------|
| | | | | | | Meeldauw | Netvlekkenziekte | Bladvlekkenziekte | Dwergroest | Met ziektenbestrijding | Zonder ziektenbestrijding | Met ziektenbestrijding | Zonder ziektenbestrijding | Brouwkwaliteit | Aandeel volgerst | Eiwitgehalte | Duizendkorrelgewicht |
| brouwgerstrassen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | KWS Irina | 97 | 8 | 7 | 6,5 | 9 | 8 | 7 | 7,5 | 102 | 100 | 100 | 100 | 8 | 99 | 98 | 100 |
| N | RGT Planet | 102 | 7 | 8 | 6,5 | 9 | 7,5 | 6,5 | 7 | 102 | 103 | 103 | 101 | 8 | 100 | 99 | 102 |
| N | Sanette | 100 | 7,5 | 6,5 | 6 | 9 | 8 | 7 | 7 | 98 | 96 | 99 | 98 | 7 | 100 | 100 | 101 |
| N | Laureate | 103 | 6,5 | 6,5 | 5,5 | 9 | 8 | 6,5 | 7 | 101 | 104 | 102 | 109 | 8* | 101 | 100 | 104 |
| B | Paustian | 102 | 8,5 | 7 | 6,5 | 8,5 | 7 | 8 | 7,5 | 98 | 101 | 99 | 101 | 8 | 100 | 100 | 98 |
| B | Quench | 100 | 7,5 | 6 | 6,5 | 9 | 7 | 6 | 6 | 96 | 92 | 92 | 93 | 7 | 99 | 103 | 94 |
| rassen in onderzoek (2 jaar) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | KWS Beckie | 96 | 8 | 7 | 6,5 | 9 | 7,5 | 6 | 6,5 | 101 | 103 | 97 | 94 | | | | |
| | Prospect | 105 | 7 | 6,5 | 6 | 9 | 8 | 8,5 | 7,5 | 102 | 105 | 104 | 105 | | | | |
| | RP 14026 | 105 | 6 | 8 | 7 | 9 | 7,5 | 6,5 | 7,5 | 99 | 98 | 99 | 99 | | | | |
| 100 = | | 75 cm | | | | | | | | 9,3 t/ha | 8,7 t/ha | 7,9 t/ha | 7,1 t/ha | | 96,2% | 9,3% | 47,6 gr |

¹⁾ Raseigenschappen hebben betrekking op de jaren 2014 t/m 2017. Korrelopbrengsten hebben betrekking op de jaren 2012 t/m 2017. Voor de kwaliteitsgegevens over het aandeel volgerst, het eiwitgehalte en het duizendkorrelgewicht is gebruik gemaakt van gegevens uit de periode 2002 t/m 2016. Lengte van het stro, korrelopbrengsten, aandeel volgerst, eiwitgehalte en duizendkorrelgewicht zijn weergegeven in verhoudingsgetallen. Hoge waarderingscijfers betekenen goede stvigheid van het stro, vroeg in de aar komen, vroeg rijp, goede resistenties, een hoog aandeel volgerst, een hoog duizendkorrelgewicht en een hoog eiwitgehalte.

²⁾ Rubricering van de Rassenlijst 2018 : A = Algemeen aanbevolen ras, B = Beperkt aanbevolen ras, N = Nieuw aanbevolen ras.

*) voorlopig cijfer op basis van 1 jaar onderzoek