

Nieuw aanbevolen ras van cichorei

Op de Aanbevelende Rassenlijst 2018 wordt een nieuw cichoreiras opgenomen. Dit meldt de Commissie Samenstelling Aanbevelende Rassenlijst (CSAR), waarin de Brancheorganisatie Akkerbouw, Plantum en LTO-Nederland samenwerken.

Het onderstaande ras is opgenomen in de N-rubriek (nieuw aanbevolen rassen). De eigenschappen staan vermeld in de bijlage.

Barite Kweker: S.A. Florimond Desprez Veuve et Fils, Cappelle-en-Pévèle (F)
Vertegenwoordiger: Erauw Holland B.V., Breda

CSAR beslist over de samenstelling van de Aanbevelende Rassenlijst. Deskundigen van het bedrijfsleven bereiden de beslissingen inhoudelijk voor. Dit gebeurt in de Werkgroep Rassenonderzoek Cichorei die onderdeel uitmaakt van de Stichting Bevordering Cichoreiteelt.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met David Kasse, secretaris van CSAR, telefoon 079 – 30 30 333 of 06 - 52 06 43 26.

Publicatie van de tabel is toegestaan, mits de gegevens integraal worden opgenomen en met bronvermelding 'CSAR, Aanbevelende Rassenlijst 2018'.

Tabel. Overzicht van eigenschappen, opbrengsten en gehalten van cichoreirassen.
Gemiddelden over de jaren 2012 t/m 2017¹⁾

Rubricering ²⁾	Rasnaam	Vroegheid grondbedekking	Schietresistentie	Wortelopbrengst	Inulinegetal	Inulineopbrengst	Financiële opbrengst ³⁾
A	Maestoso	6,5	9,0	102	101	102	102
A	Larigot	7,0	9,0	100	101	101	101
A	Goldine	7,5	6,5	101	99	100	100
A	Fugato	6,0	8,5	98	100	99	99
B	Selenite	6,5	8,0	99	99	98	98
Rassen met een specifieke herbicidetolerantie⁴⁾							
A	Benulite	7,5	6,5	97	100	97	97
N	Barite	7,5	6,0	98	100	98	98
100 = ..ton/ha, -, ton/ha, euro/ha⁵⁾				60,4	17,8	10,7	3758

¹⁾ Vroegheid grondbedekking en schietresistentie zijn weergegeven in waarderingscijfers. Hoge waarderingscijfers betekenen vroege grondbedekking en goede schietresistentie. Opbrengsten en inulinegetal zijn weer-gegeven in verhoudingsgetallen.

²⁾ Rubricering op de Rassenlijst 2018: A = Algemeen aanbevolen ras, B = Beperkt aanbevolen ras, N = Nieuw aanbevolen ras.

³⁾ Berekend op basis van € 83,50 per ton netto cichorei en € 4,60 per punt afwijking van 17,0% inuline; uitgangssituatie: 45 ton netto cichorei met 17,0% inuline, er is geen rekening gehouden met grondtarra.

⁴⁾ Benulite en Barite zijn rassen met een specifieke tolerantie tegen sulfonyl-urea herbiciden die in cichorei zijn toegelaten.

⁵⁾ 100= gemiddelde van alle in 2017 onderzochte A- en N-rassen, behalve Benulite