

## Persbericht

Zoetermeer, 26 november 2020



## Nieuw aanbevolen ras van cichorei

Op de Aanbevelende Rassenlijst 2021 wordt een nieuw cichoreiras opgenomen. Dit meldt de Commissie Samenstelling Aanbevelende Rassenlijst (CSAR), waarin de Brancheorganisatie Akkerbouw, Plantum en LTO-Nederland samenwerken.

Het onderstaande ras is opgenomen in de N-rubriek (nieuw aanbevolen rassen). De eigenschappen staan vermeld in de bijlage.

**Rhodonite** Kweker: S.A.S. Maison Florimond Desprez, Cappelle-en-Pévèle (F)

CSAR beslist over de samenstelling van de Aanbevelende Rassenlijst. Deskundigen van het bedrijfsleven bereiden de beslissingen inhoudelijk voor.

### Meer informatie

Secretariaat CSAR: Hans de Keijzer, telefoon 06 - 52723623.

Publicatie van de tabel is toegestaan, mits de gegevens integraal worden opgenomen en met bronvermelding "CSAR, Aanbevelende Rassenlijst 2021".

**Tabel.** Overzicht van eigenschappen, opbrengsten en gehalten van cichoreirassen. Gemiddelden over de jaren 2015 t/m 2020<sup>1)</sup>

Rubricering <sup>2)</sup>	Rasnaam	Vroegheid grondbedekking	Schietresistentie <sup>6)</sup>	Wortelopbrengst	Inulinegetal	Inulineopbrengst	Financiële opbrengst <sup>3)</sup>
A	Maestoso	6,5	8,5	102	100	102	102
A	Larigot	7,0	8,5	100	101	100	100
B	Fugato	6,0	8,0	98	100	97	98
B	Goldine	7,0	6,5	97	99	95	95
<b>Rassen met een specifieke eigenschap <sup>4)</sup></b>							
A	Benulite	7,5	6,5	95	99	94	95
A	Barite	7,5	5,5	95	99	94	94
N	Rhodonite	7,5	7,5	96	99	94	94
<b>rassen in onderzoek (2 jaar)</b>							
	Oratorio	6,0	9,5	103	101	104	104
<b>100 = ..ton/ha, -, ton/ha, euro/ha <sup>5)</sup></b>				<b>61,9</b>	<b>17,8</b>	<b>11,0</b>	<b>3963</b>

- 1) Vroegheid grondbedekking en schietresistentie zijn weergegeven in waarderingscijfers. Hoge waarderingscijfers betekenen vroege grondbedekking en goede schietresistentie. Opbrengsten en inulinegetal zijn weergegeven in verhoudingsgetallen.
- 2) Rubricering op de Rassenlijst 2021: A = Algemeen aanbevolen ras, B = Beperkt aanbevolen ras, N = Nieuw aanbevolen ras.
- 3) De financiële opbrengst is berekend op basis van € 79,25 per ton netto cichorei en € 0,46 per ton cichorei per 0,1 punt lager of hoger inulinegetal dan 17,0; Ausgangssituatie: 50 ton netto cichorei met 17,0% inuline; er is geen rekening gehouden met grondtarra.
- 4) Benulite, Barite en Rhodonite zijn rassen met een specifieke tolerantie tegen sulfonyl-urea herbiciden die in cichorei zijn toegelaten.
- 5) 100= gemiddelde van alle in 2020 onderzochte A- en N-rassen, behalve Benulite en Barite.
- 6) Aanbevolen wordt om rassen met een 5,5 of lager voor schietresistentie niet te vroeg te zaaien.