

Persbericht

Zoetermeer, 26 november 2020



Nieuw aanbevolen ras van cichorei

Op de Aanbevelende Rassenlijst 2021 wordt een nieuw cichoreiras opgenomen. Dit meldt de Commissie Samenstelling Aanbevelende Rassenlijst (CSAR), waarin de Brancheorganisatie Akkerbouw, Plantum en LTO-Nederland samenwerken.

Het onderstaande ras is opgenomen in de N-rubriek (nieuw aanbevolen rassen). De eigenschappen staan vermeld in de bijlage.

Rhodonite Kweker: S.A.S. Maison Florimond Desprez, Cappelle-en-Pévèle (F)

CSAR beslist over de samenstelling van de Aanbevelende Rassenlijst. Deskundigen van het bedrijfsleven bereiden de beslissingen inhoudelijk voor.

Meer informatie

Secretariaat CSAR: Hans de Keijzer, telefoon 06 - 52723623.

Publicatie van de tabel is toegestaan, mits de gegevens integraal worden opgenomen en met bronvermelding "CSAR, Aanbevelende Rassenlijst 2021".

Tabel. Overzicht van eigenschappen, opbrengsten en gehalten van cichoreirassen. Gemiddelden over de jaren 2015 t/m 2020¹⁾

Rubricering ²⁾	Rasnaam	Vroegheid grondbedekking	Schietresistentie ⁶⁾	Wortelopbrengst	Inulinegetal	Inulineopbrengst	Financiële opbrengst ³⁾
A	Maestoso	6,5	8,5	102	100	102	102
A	Larigot	7,0	8,5	100	101	100	100
B	Fugato	6,0	8,0	98	100	97	98
B	Goldine	7,0	6,5	97	99	95	95
Rassen met een specifieke eigenschap ⁴⁾							
A	Benulite	7,5	6,5	95	99	94	95
A	Barite	7,5	5,5	95	99	94	94
N	Rhodonite	7,5	7,5	96	99	94	94
rassen in onderzoek (2 jaar)							
	Oratorio	6,0	9,5	103	101	104	104
100 = ..ton/ha, -, ton/ha, euro/ha ⁵⁾				61,9	17,8	11,0	3963

- 1) Vroegheid grondbedekking en schietresistentie zijn weergegeven in waarderingscijfers. Hoge waarderingscijfers betekenen vroege grondbedekking en goede schietresistentie. Opbrengsten en inulinegetal zijn weergegeven in verhoudingsgetallen.
- 2) Rubricering op de Rassenlijst 2021: A = Algemeen aanbevolen ras, B = Beperkt aanbevolen ras, N = Nieuw aanbevolen ras.
- 3) De financiële opbrengst is berekend op basis van € 79,25 per ton netto cichorei en € 0,46 per ton cichorei per 0,1 punt lager of hoger inulinegetal dan 17,0; Ausgangssituatie: 50 ton netto cichorei met 17,0% inuline; er is geen rekening gehouden met grondtarra.
- 4) Benulite, Barite en Rhodonite zijn rassen met een specifieke tolerantie tegen sulfonyl-urea herbiciden die in cichorei zijn toegelaten.
- 5) 100= gemiddelde van alle in 2020 onderzochte A- en N-rassen, behalve Benulite en Barite.
- 6) Aanbevolen wordt om rassen met een 5,5 of lager voor schietresistentie niet te vroeg te zaaien.